

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios e répteis (herpetofauna) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Colli *et al.* 2011, 2. GBIF, 3. Vasconcelos *et al.* 2011. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣), Resgate (◇).

Classe / Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Habitat	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados Primários JBB
AMPHIBIA							
Anura							
Bufonidae	<i>Rhinella cerradensis</i> Maciel, Brandão, Campos & Sebben, 2007		Campo, Cerrado	DD		1	
	<i>Rhinella diptycha</i> (Cope, 1862)	<i>Rhinella schneideri</i> (Werner, 1894)	Campo, Cerrado, Mata	DD		1; 2	❖; ♣; *; ◇
	<i>Rhinella marina</i> (Linnaeus, 1758)			LC			♣; *
	<i>Rhinella rubescens</i> (A. Lutz, 1925)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	
Craugastoridae	<i>Barycholos ternetzi</i> (Miranda-Ribeiro, 1937)		Mata			1	
Dendrobatidae	<i>Ameerega flavopicta</i> (Lutz, 1925)			LC		2	
Hylidae	<i>Aplastodiscus perviridis</i> Lutz, 1950		Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Boana albopunctata</i> (Spix, 1824)	<i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	
	<i>Boana buriti</i> (Caramaschi and Cruz, 1999)	<i>Hypsiboas buriti</i> (Caramaschi & Cruz, 1999)	Campo, Cerrado	DD	VU	1	
	<i>Boana lundii</i> (Burmeister, 1856)	<i>Hypsiboas lundii</i> (Burmeister, 1856)	Mata	LC		1	
	<i>Boana raniceps</i> (Cope, 1862)			LC		3	*
	<i>Bokermannohyla aff. pseudopseudis</i>		Mata	LC		1	
	<i>Bokermannohyla sapiranga</i> Brandão, Magalhães, Garda, Campos, Sebben & Maciel, 2012			NE		2	
	<i>Dendropsophus jimi</i> (Napoli & Caramaschi, 1999)		Mata	LC		1	
	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)		Campo, Mata	LC		1; 2	
	<i>Dendropsophus rubicundulus</i> (Reinhardt & Lütken, 1862"1861")		Campo	LC		1	
	<i>Pithecopus azureus</i> (Cope, 1862)	<i>Phyllomedusa azurea</i> Cope, 1862	Campo, Cerrado, Mata	DD		1;	*
	<i>Pithecopus oreades</i> (Brandão, 2002)	<i>Phyllomedusa oreades</i> Brandão, 2002	Campo, Cerrado	DD		1	
	<i>Scinax fuscomarginatus</i> (A. Lutz, 1925)		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)		Campo, Cerrado	LC		1; 2	
	<i>Scinax</i> sp. (aff. <i>ruber</i>)		Campo, Cerrado			1	
	<i>Scinax</i> sp. (aff. <i>similis</i>)		Campo			1	
	<i>Scinax squalirostris</i> Lutz, 1925		Campo	LC		1	
	<i>Scinax tigrinus</i> Nunes, Carvalho e Pereira, 2010		Campo, Cerrado	LC		1	
Leptodactylidae	<i>Adenomera juikitam</i> Carvalho & Giaretta, 2013			NE		2	
	<i>Leptodactylus furnarius</i> Sazima & Bokermann, 1978		Campo	LC		1; 2	
	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	❖; ◇

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios e répteis (herpetofauna) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Colli *et al.* 2011, 2. GBIF, 3. Vasconcelos *et al.* 2011. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣), Resgate (◇).

Classe / Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Habitat	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados Primários JBB
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)		Mata	LC		1	
	<i>Leptodactylus mystacinus</i> (Burmeister, 1861)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Leptodactylus sertanejo</i> Giaretta & Costa, 2007		Cerrado	LC		1	
	<i>Leptodactylus syphax</i> Bokermann, 1969		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Physalaemus centralis</i> Bokermann, 1962		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	*
	<i>Physalaemus marmoratus</i> (Reinhardt & Lütken, 1862)		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Physalaemus nattereri</i> (Steindachner, 1863)	<i>Eupemphix nattereri</i> Steindachner, 1863	Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Pseudopaludicola mystacalis</i> (Cope, 1887)		Campo	LC		1	
Myrohyllidae	<i>Chiasmocleis albopunctata</i> (Boettger, 1885)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Elachistocleis cesarii</i> Miranda-Ribeiro, 1920		Campo, Cerrado, Mata	NE		1	
Odontophrynidae	<i>Proceratophrys goyana</i> (Miranda-Ribeiro, 1937)		Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Proceratophrys salvatori</i> (Caramaschi, 1996)		Campo, Cerrado	DD		1	
Phyllomedusidae	<i>Pithecopus hypochondrialis</i> (Daudin, 1800)			LC		2	
Gymnophiona							
Siphonopidae	<i>Siphonops paulensis</i> Boettger, 1892		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	♣; X
REPTILIA							
Squamata							
Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	❖; ♣; *; X; ◇
	<i>Amphisbaena anaemariae</i> Vanzolini, 1997		Cerrado, Mata	LC		1;	♣
	<i>Amphisbaena mensae</i> Mello, 2000		Campo, Cerrado	NE		1	
	<i>Amphisbaena vermicularis</i> Wagler, 1824		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	
	<i>Leposternon microcephalum</i> Wagler, 1824		Campo, Mata	LC		1	
Anguidae	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758			LC			♣
Boidae	<i>Boa constrictor</i> Linnaeus, 1758		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2;	❖; ♣; *; X; ◇
	<i>Epicrates crassus</i> Cope, 1862		Campo, Cerrado	LC		1;	*; X; ◇
Colubridae	<i>Apostolepis albicollaris</i> Lema, 2002		Campo, Cerrado	LC		1;	X
	<i>Apostolepis assimilis</i> (Reinhardt, 1861)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1;	◇
	<i>Apostolepis flavotorquata</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		Cerrado	LC		1	
	<i>Atractus pantostictus</i> Fernandes & Puerto, 1993		Cerrado, Mata	LC		1	

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios e répteis (herpetofauna) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Colli *et al.* 2011, 2. GBIF, 3. Vasconcelos *et al.* 2011. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣), Resgate (◇).

Classe / Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Habitat	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados Primários JBB
Colubridae	<i>Chironius flavolineatus</i> (Boettger, 1885)		Campo, Cerrado	LC		1;	X
	<i>Chironius flavopictus</i> (Werner, 1909)			DD			◇
	<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Dipsas mikanii</i> (Schlegel, 1837)	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	Campo, Mata	NE		1; 2	♣; ◇
	<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)		Mata	LC		1; 2	♣; *; X; ◇
	<i>Erythrolamprus maryellenae</i> (Dixon, 1985)	<i>Liophis maryellenae</i> Dixon, 1985	Campo	LC		1	
	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i> (Wied-Neuwied, 1824)	<i>Liophis poecilogyrus</i> (Wied, 1825)	Campo, Cerrado, Mata	LC		1;	*
	<i>Erythrolamprus reginae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Liophis reginae</i> (Linnaeus, 1758)	Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Lygophis meridionalis</i> (Schenkel, 1901)			LC		2	
	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1978		Campo, Cerrado, Mata	LC		1;	♣; X; ◇
	<i>Oxyrhopus rhombifer</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854		Campo, Cerrado	LC		1; 2	*
	<i>Oxyrhopus trigeminus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Palusophis bifossatus</i> Raddi, 1820	<i>Mastigodryas bifossatus</i> (Raddi, 1920)	Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Phalotris nasutus</i> (Gomes, 1915)		Campo, Cerrado	LC		1;	♣
	<i>Philodryas aestiva</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Philodryas agassizii</i> (Jan, 1863)		Campo, Cerrado	LC		1;	◇
	<i>Philodryas nattereri</i> (Steindachner, 1870)		Cerrado, Campo	LC		1; 2	❖; *; ◇
	<i>Philodryas olfersii</i> (Lichtenstein, 1823)		Cerrado, Mata	LC		1; 2	❖; ♣; *; ◇
	<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1858)		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Phimophis guerini</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		Campo, Cerrado	LC		1;	◇
	<i>Pseudoboa nigra</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)			LC			◇
	<i>Rhachidelus brazili</i> Boulenger, 1908		Campo	LC		1; 2	◇
	<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)		Cerrado, Mata	LC		1	
<i>Taeniophallus occipitalis</i> (Jan, 1863)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1		
<i>Tantilla melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)		Cerrado, Campo	LC		1		
<i>Thamnodynastes hypoconia</i> (Cope, 1860)		Campo	LC		1		
<i>Xenodon merremii</i> (Wagler, 1824)		Campo, Cerrado	LC		1; 2	♣; *; ◇	
<i>Xenodon nattereri</i> (Steindachner, 1864)		Campo, Cerrado	LC		1		
Dactyloidae	<i>Anolis meridionalis</i> Boettger, 1885		Campo, Cerrado, Mata	LC		1;	*

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios e répteis (herpetofauna) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Colli *et al.* 2011, 2. GBIF, 3. Vasconcelos *et al.* 2011. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣), Resgate (◇).

Classe / Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Habitat	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados Primários JBB
Diploglossidae	<i>Ophiodes</i> sp.1 (sensu Borges-Martins, 1998)		Campo, Cerrado, Mata			1	
	<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1824)		Campo, Cerrado	LC		1; 2	♣; *
Elapidae	<i>Micrurus frontalis</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Micrurus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)			LC		2	
Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouya</i> (Moreau de Jonnés, 1818)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	
Gymnophthalmidae	<i>Bachia bresslaui</i> (Amaral, 1935)		Campo, Cerrado	VU		1	
	<i>Cercosaura ocellata</i> Wagler, 1830		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Cercosaura schreibersii</i> Wiegmann, 1834		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	
	<i>Colobosaura modesta</i> (Reinhardt & Luetken, 1862)		Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Micrablepharus atticolus</i> Rodrigues, 1996		Campo, Cerrado	LC		1	
Leiosauridae	<i>Enyalius</i> aff. <i>bilineatus</i> Breitman et al., 2018		Mata	LC		1;	*
	<i>Enyalius capetinga</i> Breitman et al., 2018			NE		2	
Polychrotidae	<i>Polychrus acutirostris</i> Spix, 1825		Campo, Cerrado	LC		1; 2	❖; ♣; *
Scincidae	<i>Aspronema dorsivittatum</i> (Cope, 1862)	<i>Mabuya dorsivittata</i> Cope, 1862	Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	
	<i>Copeoglossum nigropunctatum</i> (Spix, 1825)	<i>Mabuya nigropunctata</i> (Spix, 1825)	Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	*
	<i>Manciola guaporicola</i> (Dunn, 1935)	<i>Mabuya guaporicola</i> Dunn, 1936	Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Notomabuya frenata</i> (Cope, 1862)	<i>Mabuya frenata</i> (Cope, 1862)	Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	*
Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	♣
	<i>Kentropyx paulensis</i> Boettger, 1893		Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Salvator duseni</i> (Lönnerberg, 1910)	<i>Tupinambis duseni</i> Lönnerberg, 1896	Campo, Cerrado	LC		1	
	<i>Salvator merianae</i> Duméril & Bibron, 1839			LC		2	*
	<i>Tupinambis quadrilineatus</i> Manzani & Abe, 1997			LC			*
Teiidae	<i>Tupinambis teguixin</i> (Linnaeus, 1758)			LC			*
Tropiduridae	<i>Tropidurus itambere</i> Rodrigues, 1987		Campo, Cerrado, Mata	LC		1	
	<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820)		Mata	LC		1; 2	♣
Viperidae	<i>Bothrops itapetiningae</i> (Boulenger, 1907)		Campo, Cerrado	VU		1; 2	*
	<i>Bothrops marmoratus</i> Da Silva & Rodrigues, 2008			LC		2	
	<i>Bothrops moojeni</i> Hoge, 1966		Cerrado	LC		1; 2	♣; *, X; ◇;
	<i>Bothrops neuwiedii</i> Wagler, 1824		Campo, Cerrado	LC		1	♣; *, ◇;
	<i>Bothrops pauloensis</i> Amaral, 1925			LC		2	
	<i>Crotalus durissus</i> Linnaeus, 1758		Campo, Cerrado, Mata	LC		1; 2	❖; *, ◇;

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios e répteis (herpetofauna) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Colli *et al.* 2011, 2. GBIF, 3. Vasconcelos *et al.* 2011. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣), Resgate (◇).

Classe / Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Habitat	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados Primários JBB
Testudines							
Chelidae	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i> (Bour, 1973)		Mata	NT		1;	◇
	<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)			NE		2;	*; X; ◇
Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonaria</i> (Spix, 1824)						*
	<i>Chelonoidis denticulatus</i> (Linnaeus, 1766)			VU			*

- Colli, G.R., Nogueira, C.D.C., Pantoja, D.L., Ledo, R.M.D., Costa, B.M. & Brandão, R. A. (2011) Herpetofauna da Reserva Ecológica do IBGE e seu entorno. *Reserva Ecológica do IBGE*. Tomo 2. 1ª ed. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 131-145.
- GBIF: The Global Biodiversity Information Facility (2023) *What is GBIF?* Disponível em: <https://www.gbif.org/what-is-gbif>.
- Vasconcelos, B., dos Santos Campos, E. R., Alcântara de Sena, V. M., Torres Cardoso, A. G., do Nascimento dos Santos Abreu, J. M., & Albuquerque Brandão, R. (2022). New records of *Boana raniceps* (Cope, 1862) (Anura, Hylidae) in Distrito Federal, Central Brazil: evidence of recent distribution expansion? *Heringeriana* 16(1): e917969. <https://doi.org/10.17648/heringeriana.v16i1.917969>

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Accipitriformes							
Accipitridae	<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847		Gavião de-rabo-barrado	LC		1	
	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816		Gavião-de-cauda-curta	LC		1	
	<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)		Gavião-pedrês	LC		1	*
	<i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	Gavião-caboclo	LC		1, 2	
	<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)		Gavião-preto	LC		1	
	<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)		Caracoleiro	LC		1	
	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)		Gavião-do-banhado	LC		1	
	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)		Gavião-peneira	LC		1	
	<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825		Gaviãozinho	LC		1	
	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	Gavião-de-rabo-branco	LC		1	
	<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)		Sovi	LC		2	
	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)		Gavião-de-cabeça-cinza	LC		1	
	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	<i>Buteo magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	Gavião-carijó	LC		1, 2	*; ●
<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	<i>Harpyhaliaetus coronatus</i> (Vieillot, 1817); <i>Buteogallus coronatus</i> (Vieillot, 1817)	Águia-cinzenta	EN	EN	1	*; ●	
Anseriformes							
Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)		Pé-vermelho	LC		1, 2	
	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)		Asa-branca	LC		1	
	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)		Marreca-caneleira	LC		1	
	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)		Irerê	LC		1	
Apodiformes							
Apodidae	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907		Andorinhão-do-temporal	LC		1	
	<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)		Taperuçu-velho	LC		1	
	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)		Taperuçu-de-cabeça-branca	LC		1	
Trochilidae	<i>Amazilia fimbriata</i> (J.F.Gmelin, 1788)		Beija-flor-de-garganta-verde	LC		1, 2	
	<i>Amazilia lactea</i> (R. Lesson, 1832)	<i>Chionomesa lactea</i> (R. Lesson, 1832)	Beija-flor-de-peito-azul	LC		1	
	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)		Beija-flor-de-veste-preta	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)		Besourinho-de-bico-vermelho	LC		1, 2	
	<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)		Beija-flor-vermelho	LC		1	
	<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)		Beija-flor-de-orelha-violeta	LC		1, 2	
	<i>Eupetomena macroura</i> (J.F.Gmelin, 1788)		Beija-flor-tesoura	LC		1, 2	
	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)		Beija-flor-preto	LC		2	
	<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)		Chifre-de-ouro	LC		1	
	<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)		Popetinho-vermelho	LC		1	
	<i>Phaethornis pretrei</i> (R. Lesson & Delattre, 1839)		Rabo-branco-avermelhado	LC		1	
	<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)		Beija-flor-de-bico-curvo	LC		1	
	<i>Thalurania furcata</i> (J. F. Gmelin, 1788)		Beija-flor-tesoura-verde	LC		1	
	<i>Thalurania glaucopis</i> (J. F. Gmelin, 1788)		Beija-flor-de-frente-violeta	LC		1	
Caprimulgiformes							
Caprimulgidae	<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)		Bacurau-de-asa-fina	LC		1	
	<i>Chordeiles nacunda</i> (Vieillot, 1817)	<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	Coruçã	LC		1	
	<i>Chordeiles pusillus</i> Gould, 1861		Bacurauzinho	LC		1	
	<i>Hydropsalis torquata</i> (J. F. Gmelin, 1789)		Bacurau-tesoura	LC		1	
	<i>Nyctidromus albicollis</i> (J.F.Gmelin, 1789)		Bacurau	LC		1, 2	*; X; ◊
	<i>Setopagis parvula</i> (Gould, 1837)	<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	Bacurau-chintã	LC		1	
Cariamiformes							
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)		Seriema	LC		1, 2	◎
Cathartiformes							
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)		Urubu-de-cabeça-vermelha	LC		1	
	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)		Urubu-de-cabeça-preta	LC		1, 2	◊
	<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)		Urubu-rei	LC		1	
Charadriiformes							
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)		Quero-quero	LC		1, 2	❖
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)		Maçarico-pintado	LC		1	
	<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)		Narceja	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (✚), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Columbiformes							
Columbidae	<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Pérez, 1886)		Pararu-azul	LC		1	
	<i>Columbina squammata</i> (R.Lesson, 1831)		Fogo-apagou	LC		1, 2	✚
	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)		Rolinha-roxa	LC		1, 2	
	<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)		Juriti-vermelha	LC		1	
	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)		Juriti-gemedeira	LC		1	
	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855		Juriti-pupu	LC		1	
	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)		Pomba-galega	LC		1	
	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)		Pombão	LC		1, 2	❖; ✚; X
	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)		Pomba-amargosa	LC		1	
	<i>Patagioenas speciosa</i> (J. F. Gmelin, 1789)		Pomba-trocal	LC		1	
	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)		Pomba-de-bando	LC		1	
Coraciiformes							
Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)		Martim-pescador-verde	LC		1	
	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)		Martim-pescador-pequeno	LC		1, 2	
	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)		Martim-pescador-grande	LC		1, 2	
Momotidae	<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)		Juruva-verde	LC		1	
Cuculiformes							
Cuculidae	<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873		Papa-lagarta-de-euler	LC		1	
	<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817		Papa-lagarta-acanelado	LC		1	
	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758		Anu-preto	LC		1, 2	
	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)		Anu-branco	LC		1, 2	❖
	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)		Alma-de-gato	LC		1, 2	❖
	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)		Saci	LC		1	
Falconiformes							
Falconidae	<i>Caracara plancus</i> (J.F.Miller, 1777)		Caracará / Carcará	LC		1, 2	❖; *; ◊; ●
	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822		Falcão-de-coleira	LC		1	
	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758		Quiriquiri	LC		1	❖
	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)		Acauã	LC		1, 2	
	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)		Falcão-relógio	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (⊙).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Falconidae	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)		Carrapateiro	LC		1	❖
Galbuliformes							
Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)		João-bobo	LC		1, 2	❖
	<i>Nystalus maculatus</i> (J.F.Gmelin, 1788)		Rapazinho-dos-velhos	LC		2	
Galbulidae	<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)		Ariramba-preta	LC		1	
	<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816		Ariramba-de-cauda-ruiva	LC		1, 2	
Galliformes							
Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815		Jacupemba	NT		1	*
Gruiformes							
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)		Carão	LC		2	
Rallidae	<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)		Saracura-lisa	LC		1	
	<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)		Saracura-três-potes	LC		1	*
	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)			LC			❖
	<i>Laterallus xenopterus</i> Conover, 1934		Sanã-de-cara-ruiva	VU	EN	1	
	<i>Micropygia schomburgkii</i> (Cabanis, 1848)		Maxalalagá	LC		1	
	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)		Saracura-sanã	LC		1	
	<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)		Sana-carijó	LC		1	
	<i>Rufirallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	Sanã-castanha	LC		1	
Nyctibiiformes							
Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i> (J.F.Gmelin, 1789)		Mãe-da-lua	LC		1, 2	❖
Passeriformes							
Cardinalidae	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)		Sanhaçu-de-fogo	LC		1, 2	
Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)		Chupa-dente	LC		1	
Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)		Gralha-do-cerrado	LC		1, 2	
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)		Arapaçu-de-cerrado	LC		1	
	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)		Arapaçu-verde	LC		1	
	<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)		Arapaçu-de-garganta-branca	LC		1	
	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)		Arapaçu-rajado	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◆), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)		Bico-de-lacre	LC		1	
Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)		Fim-fim	LC		1	*
	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)		Gaturamo-verdadeiro	LC		2	
Furnariidae	<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	<i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805)	Pintassilgo	LC		1	
	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)		Cochicho	LC		1	
	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied-Neuwied, 1821)		Barraqueiro-de-olho-branco	LC		1	
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)		Curutié	LC		2	
	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)		João-de-barro	LC		1, 2	
	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)		João-porca	LC		1	
	<i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817)		Graveteiro	LC		1	
	<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied-Neuwied, 1821)		João-de-pau	LC		1	
	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)		Limpa-folha-de-testa-baia	LC		1	
	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823		Uipí	LC		1	
	<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859		Petrim	LC		1	
	<i>Synallaxis scutata</i> P. L. Sclater, 1859		Estrelinha-preta	LC		1	
	<i>Syndactyla dimidiata</i> (Pelzeln, 1859)		Limpa-folha-do-brejo	LC		1	
	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821		Bico-virado-carijó	LC		1	
Hirundinidae	<i>Alopocheidon fucata</i> (Temminck, 1822)		Andorinha-morena	LC		1	
	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758		Andorinha-de-bando	LC		1	
	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)		Andorinha-doméstica-grande	LC		1	
	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)		Andorinha-do-campo	LC		1, 2	
	<i>Pygocheidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)		Andorinha-pequena-de-casa	LC		1, 2	
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)		Andorinha-serradora	LC		1	
	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)		Andorinha-de-sobre-branco	LC		1	
Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)		Graúna	LC		1	◆
	<i>Icterus cayanensis pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	Encontro	LC		2	
	<i>Icterus icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	Corrupião	LC		2	
	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)		Vira-bosta	LC		1, 2	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (✚), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Melanopareiidae	<i>Melanopareia torquata</i> (Wied-Neuwied, 1831)		Tapaculo-de-colarinho	LC		1	
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)		Sabiá-do-campo	LC		1, 2	❖; ✚
Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855		Caminheiro-zumbidor	LC		2	
Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)		Pula-pula	LC		2	
	<i>Basileuterus culicivorus hypoleucus</i> Bonaparte, 1850	<i>Basileuterus hypoleucus</i> Bonaparte, 1850	Pula-pula-de-barriga-branca	LC		1	
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (J. F. Gmelin, 1789)		Pia-cobra	LC		1	
	<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	<i>Basileuterus flaveolus</i> (S. F. Baird, 1865)	Canário-do-mato; Pula-pula-amarelo	LC		1	*
	<i>Myiothlypis leucophrys</i> (Pelzeln, 1868)	<i>Basileuterus leucophrys</i> Pelzeln, 1868	Pula-pula-de-sombrancelha	LC		1, 2	
	<i>Setophaga pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	<i>Parula pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	Mariquita	LC		1, 2	
Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i> (P. L. Stadius Müller, 1776)		Tico-tico	LC		1, 2	
Passeridae	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	<i>Myospiza humeralis</i> (Bosc, 1792)	Tico-tico-do-campo	LC		1	
	<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838			LC			X
	<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)			LC		1	
	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)		Pardal	LC		1, 2	
Pipridae	<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)		Soldadinho	LC		1, 2	*
Poliotilidae	<i>Poliottila dumicola</i> (Vieillot, 1817)		Balança-rabo-de-máscara	LC		1, 2	
Rhinocryptidae	<i>Scytalopus novacapitalis</i> Sick, 1958		Tapaculo-de-brasília	EN	EN	1	
Scleruridae	<i>Geositta poeciloptera</i> (Wied-Neuwied, 1830)	<i>Geobates poecilopterus</i> (Wied-Neuwied, 1830)	Andarilho	VU	VU	1	
Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868		Chorozinho-de-boné	LC		1	
	<i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868		Chorozinho-de-bico-comprido	LC		1	
	<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)		Choró-boi	LC		2	
	<i>Thamnophilus caeruleus</i> Vieillot, 1816		Choca-da-mata	LC		1, 2	
	<i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924		Choca-do-planalto	LC		2	*
	<i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825		Choca-de-asa-vermelha	LC		2	❖
Thraupidae	<i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905		Mineirinho	NT		1	
	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)		Cambacica	LC		1, 2	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (⊙).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Thraupidae	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)		Figuinha-de-rabo-castanho	LC		1	
	<i>Coryphasiza melanotis</i> (Temminck, 1822)		Tico-tico-de-máscara-negra	VU	VU	1	
	<i>Coryphospingus cucullatus</i> (P. L. Stenius Müller, 1776)		Tico-tico-rei	LC		1, 2	
	<i>Coryphospingus pileatus</i> (zu Wied-Neuwied, 1821)		Tico-tico-rei-cinza	LC		2	
	<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)		Bandoleta	LC		1	*
	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)		Saí-azul	LC		1, 2	
	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)		Canário-do-campo	LC		1	
	<i>Eucometis penicillata</i> (von Spix, 1825)		Pipira-da-taoca	LC		1, 2	
	<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)		Saíra-de-papo-preto	LC		1, 2	
	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)		Saíra-de-chapéu-preto	LC		1	
	<i>Neothraupis fasciata</i> (M. H. K. Lichtenstein, 1823)		Cigarra-do-campo	NT		1	
	<i>Porphyospiza caerulescens</i> (zu Wied-Neuwied, 1830)		Campainha-azul	NT		1	
	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)		Pipira-vermelha	LC		1	
	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837		Trinca-ferro	LC		1, 2	◊
	<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)		Bico-de-pimenta	LC		1	
	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)		Sanhaçu-de-coleira	LC		1, 2	
	<i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870		Canário-rasteiro	LC		1	
	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)		Canário-da-terra	LC		1, 2	❖; *; ◊
	<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)		Tipui	LC		1	
	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)		Curió	LC		1	◊
	<i>Sporophila bouvreuil</i> (P. L. Stenius Müller, 1776)		Caboclinho	LC		1	
	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)		Coleirinho	LC		1	
	<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)			VU		3	
	<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)			LC		2	
	<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)			LC		2	
	<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	<i>Sporophila melanops</i> (Pelzeln, 1870)	Baiano	LC		1, 2	❖; ◊
	<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)			EN	VU	3	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (✚), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (⊙).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Thraupidae	<i>Sporophila pileata</i> (P.L.Sclater, 1865)			LC		2	
	<i>Sporophila plumbea</i> (zu Wied-Neuwied, 1830)		Patativa	LC		1	
	<i>Stilpnia cayana</i> (Linnaeus, 1766)			NE		2	
	<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)		Pipira-preta	LC		1, 2	
	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Stilpnia cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Saíra-amarela	LC		1	
	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)		Saí-andorinha	LC		1, 2	
	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)		Saí-canário	LC		1	
	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied-Neuwied, 1821)		Sanhaçu-do-coqueiro	LC		1	
	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)		Sanhaçu-cinzento	LC		1, 2	
	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)		Tiê-de-topete	LC		1	
Tityridae	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)		Tiziu	LC		1, 2	❖
	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)		Caneleiro-preto	LC		1	
	<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)		Caneleiro-verde	LC		1	
	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)		Flautim	LC		1	
	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)		Anambé-branco-de-rabo-preto	LC		1	
Troglodytidae	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)		Anambé-branco-de-bochecha-parda	LC		1	
	<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)		Garrinchão-de-barriga-vermelha	LC		1, 2	
	<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)		Corruíra-do-campo	LC		1	
	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823		Corruíra	LC		1, 2	
Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)			LC			*
	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818		Sabiá-coleira	LC		1	
	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850		Sabiá-poca	LC		1, 2	
	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818		Sabiá-barranco	LC		1, 2	*
	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818		Sabiá-laranjeira	LC		1, 2	◊
Tyrannidae	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)		Sabiá-ferreiro	LC		1	
	<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)		Galito	VU	VU	1	
	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)		Risadinha	LC		1	
	<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)		Marianinha-amarela	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB	
Tyrannidae	<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)			LC		2		
	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied-Neuwied, 1831)		Guaracavuçu	LC		1		
	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)		Viuvinha	LC		1, 2		
	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)		Papa-moscas-cinzento	LC		1		
	<i>Corythopis delalandi</i> (Lesson, 1831)		Estalador	LC		1		
	<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)		Papa-moscas-do-campo	VU		1		
	<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865		Chibum	LC		1		
	<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868		Guaracava-de-topete-uniforme	LC		1		
	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)		Guaracava-de-barriga-amarela	LC		1, 2	❖; X	
	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)		Tuque	LC		1		
	<i>Elaenia obscura</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)		Tucão	LC		1		
	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)				LC		2	
	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)			Peitica	LC		1, 2	
	<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied-Neuwied, 1831			Barulhento	LC		1	
	<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	<i>Fluvicola pica albiventer</i> (Spix, 1825)		Lavadeira-de-cara-branca	LC		1	
	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)		Peitica-de-chapéu-preto	LC		1	
	<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)			Tesoura-do-brejo	LC		1	
	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)			Sebinho-de-olho-de-ouro	LC		1	
	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)			Gibão-de-couro	LC		1	
	<i>Knipolegus franciscanus</i> E. Snethlage, 1928	<i>Knipolegus aterrimus franciscanus</i> E. Snethlage, 1928		Maria-preta-do-nordeste	LC	VU	1	
	<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828			Maria-preta-de-penacho	LC		1	*
	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)			Enferrujado	LC		1	
	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846			Cabeçudo	LC		1	
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)			Suiriri-cavaleiro	LC		1, 2		
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)			Neinei	LC		1		

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (✚), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Tyrannidae	<i>Mionectes rufiventris</i>	Cabanis, 1846	Abre-asa-de-cabeça-cinza	LC		1, 2	
	<i>Myiarchus ferox</i>	(Gmelin, 1789)	Maria-cavaleira	LC		1	
	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Cabanis & Heine, 1859	Irré	LC		1	
	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	(Statius Muller, 1776)	Maria-cavaleira-de-cauda-castanha	LC		1	
	<i>Myiobius barbatus</i>	(Gmelin, 1789)	Assanhadinho	LC		1	
	<i>Myiodynastes maculatus</i>	(Statius Muller, 1776)	Bem-te-vi-rajado	LC		1, 2	
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	(Statius Muller, 1776)	Filipe	LC		1	
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	(Linnaeus, 1766)		LC		2	
	<i>Myiozetetes similis</i>	(Spix, 1825)		LC		2	
	<i>Phaeomyias murina</i>	(Spix, 1825)	Bagageiro	LC		1	
	<i>Philohydor lictor</i>	(Lichtenstein, 1823)	Bentevizinho-do-brejo	LC		1	
	<i>Phyllomyias virescens</i>	(Temminck, 1824)	Piolhinho-verdoso	LC		1	
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	(Linnaeus, 1766)	Bem-te-vi	LC		1, 2	*✚
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	(Boddaert, 1783)	Príncipe	LC		1	
	<i>Satrapa icterophrys</i>	(Vieillot, 1818)	Suiriri-pequeno	LC		1	
	<i>Serpophaga subcristata</i>	(Vieillot, 1817)	Alegrinho	LC		1	
	<i>Suiriri suiriri</i>	(Vieillot, 1818)	Suiriri-cinzento	LC		1	
	<i>Todirostrum cinereum</i>	(Linnaeus, 1766)	Ferreirinho-estriado	LC		1, 2	
	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	(Wied-Neuwied, 1831)	Bico-chato-amarelo	LC		1	
	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	(Spix, 1825)	Bico-chato-de-orelha-preta	LC		1, 2	
	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	(Spix, 1825)		LC		2	
	<i>Tyrannus albogularis</i>	Burmeister, 1856	Suiriri-de-garganta-branca	LC		1	
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot, 1819	Suiriri	LC		1, 2	❖
<i>Tyrannus savana</i>	Vieillot, 1808	Tesourinha	LC		1, 2		
<i>Xolmis cinereus</i>	(Vieillot, 1816)	Primavera	LC		1, 2		
<i>Xolmis velatus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Noivinha-branca	LC		1		
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	(Gmelin, 1789)	Pitiguari	LC		1, 2	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (✚), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Vireonidae	<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)		Vite-vite-de-olho-cinza	LC		1	
	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)			LC		2	
	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)		Juruviara	LC		1	
Pelecaniformes							
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	Garça-branca-grande	LC		1	
	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)		Socozinho	LC		1	
	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)		Garça-branca-pequena	LC		1	
	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)		Savacu	LC		1	
	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)		Maria-faceira	LC		1, 2	
Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)		Coró-coró	LC		1, 2	❖; ●
	<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)			LC		2	
	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)		Curicaca	LC		1, 2	
Piciformes							
Picidae	<i>Campephilus melanoleucos</i> (J.F.Gmelin, 1788)		Pica-pau-de-topete-vermelho	LC		1, 2	
	<i>Celeus flavescens</i> (J. F. Gmelin, 1788)		Pica-pau-de-cabeça-amarela	LC		1	
	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)		Pica-pau-do-campo	LC		1, 2	❖; ●
	<i>Colaptes melanochloros</i> (J.F.Gmelin, 1788)		Pica-pau-verde-barrado	LC		1, 2	
	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)		Pica-pau-de-banda-branca	NE		1, 2	
	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)		Birro	LC		1, 2	
	<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840		Pica-pau-anão-escamado	LC		1, 2	◊
	<i>Veniliornis mixtus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Dryobates mixtus</i> (Boddaert, 1783); <i>Picoides mixtus</i> (Boddaert, 1783); <i>Picus mixtus</i> Boddaert, 1783	Pica-pau-chorão	LC		1, 2	
	<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Dryobates passerinus</i> (Linnaeus, 1766); <i>Picus passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	Picapauzinho-anão	LC		1	*
	Ramphastidae	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766		Tucano-de-bico-verde	LC		1
<i>Ramphastos toco</i> P. L. S. Müller, 1776			Tucanuçu	LC		1, 2	*; X; ◊
<i>Ramphastos vitellinus</i> M. H. K. Lichtenstein, 1823			Tucano-de-bico-preto	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Resgate (◊), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Psittaciformes							
Psittacidae	<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	<i>Amazona xanthops</i> (Spix, 1824)	Papagaio-galego	NT		1, 2	
	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)		Papagaio-verdadeiro	NT		1	
	<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)		Arara-canindé	LC		1, 2	*
	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)		Periquito-de-encontro-amarelo	LC		1, 2	*; ◊
	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)		Periquito-rico	LC		1	
	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)		Maracanã-pequena	LC		2	
	<i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	Periquito-rei	LC		1, 2	
	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)		Tuim	LC		1, 2	
	<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)		Maracanã-do-buriti	LC		2	
	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)		Maitaca-verde	LC		1	
	<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Müller, 1776)	<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	Periquitão-maracanã	LC		1, 2	
Rheiformes							
Rheidae	<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)		Ema	NT		1	
Strigiformes							
Strigidae	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	<i>Pseudoscops clamator</i> (Vieillot, 1808)	Coruja-orelhuda	LC		1	*; ◊
	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Strix flammea</i> Pontoppidan, 1763		LC		2	
	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)		Coruja-buraqueira	LC		1, 2	❖; *
	<i>Bubo virginianus</i> (J. F. Gmelin, 1788)		Jacurutu	LC		1	❖
	<i>Glaucidium brasilianum</i> (J.F.Gmelin, 1788)		Caburé	LC		1, 2	◊
	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	<i>Otus choliba</i> (Vieillot, 1817); <i>Strix choliba</i> Vieillot, 1817	Corujinha-do-mato	LC		1	*
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)		Coruja-da-igreja	LC		1, 2	❖; ◊; ●
Suliformes							
Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)		Biguatinga	LC		2	
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)		Biguá	LC		1	
Tinamiformes							
Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)		Inhambu-chororó	LC		1	♣; *
	<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)		Jaó	LC		1	
	<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)		Codorna-amarela	LC		1	

Tabela 2. Lista de espécies de aves da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Tubelis 2011, 2. GBIF, 3. de Jesus *et al.* 2012. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (✱), Óbito (✕), Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Sinônimos	Nomes populares	Status IUCN	Status MMA	Fontes Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Tinamidae	<i>Nothura minor</i> (von Spix, 1825)		Codorna-mineira	VU	EN	1	
	<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)		Perdiz	LC		1, 2	❖; ◎
	<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)		Inhambu-carapé	EN	EN	1	

1. Tubelis, D.P. (2011) A Reserva Ecológica do IBGE e sua contribuição ao conhecimento e à conservação da avifauna do Cerrado. In: Ribeiro, M.L. (Org.) *Reserva Ecológica do IBGE* Volume 1: Biodiversidade terrestre. Tomo 2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
2. GBIF: The Global Biodiversity Information Facility (2023) *What is GBIF?* Disponível em: <https://www.gbif.org/what-is-gbif>.
3. de Jesus, S., Salaroli, B.F., Buzzato, A.C., Araújo, A.C. & Santos, L.S. Primeiros registros documentados de *Sporophila palustres* e *Sporophila cinnamomea* (Passeriformes: Emberizidae) para o Distrito Federal. *Atualidades Ornitológicas* 165: 12-14.

Tabela 3. Lista de espécies de mamíferos da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Schneider *et al.* 2011, 2. Bonvicino *et al.* 2020, 3. Aguiar 2000, 4. GBIF. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣) (P) - Pegada, (F) - Fezes, (T) - Toca, Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Nome-popular	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Artiodactyla						
Cervidae	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Veado-mateiro	DD		1; 2	*; ◎
	<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer [von Waldheim], 1814)	Veado-catingueiro	LC		1; 2; 4	*; X; ♣ (P); ◊; ◎
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (Linnaeus, 1758)	Veado-campeiro	NT	VU	1; 2; 4	*; ♣ (P); ◎
Carnivora						
Canidae	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Graxaim-do-mato, cachorro-do-mato	LC		1; 2; 4	❖; ♣; *; X; ♣ (F e P); ◊; ◎
	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	Lobo-guará, guará	NT	VU	1; 2; 4	❖; *; ♣ (F e P); ◎
	<i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	Raposa-do-campo	NT	VU	1; 2	
	<i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)	Cachorro-do-mato-vinagre	NT	VU	1	
Felidae	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (E. Geoffroy & Saint-Hilaire, 1803)	Jaguarundi, gato-mourisco	LC	VU	1; 2	❖; ◊; ◎
	<i>Leopardus cf. emiliae</i> (Thomas, 1914)				2	
	<i>Leopardus colocolo</i> (Molina, 1782)	Gato-palheiro	NT	VU	1	
	<i>Leopardus pardalis (mitis)</i> (F. G. Cuvier, 1820)	Jaguaritica	LC		1; 2	*; ♣ (P); ◎
	<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	Onça-parda, sussuarana	LC		1; 2	*; ♣ (F e P); ◊; ◎
Mephitidae	<i>Conepatus amazonicus</i> (Lichtenstein, 1838)	Jaritataca	LC		1; 2	❖; *; X; ♣ (P); ◎
Mustelidae	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Irara	LC		1	
	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	Furão-pequeno	LC		1; 2; 4	❖; *; ♣ (P); ◊
	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	Lontra	NT		2	❖; *
Procyonidae	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	Quati	LC		1; 2	*; ♣ (P); ◎
	<i>Procyon cancrivorus</i> (G.[Baron] Cuvier, 1798)	Mão-pelada	LC		1; 2; 4	♣ (F e P); ◎
Chiroptera						
Emballonuridae	<i>Peropteryx macrotis</i> (Wagner, 1843)	Morcego	LC		1	
Furipteridae	<i>Furipterus horrens</i> (F. Cuvier, 1828)	Morcego	LC	VU	1	
Molossidae	<i>Cynomops planirostris</i> (Peters, 1866)	Morcego	LC		1	
	<i>Molossops temminckii</i> (Burmeister, 1854)	Morcego	LC		1	
	<i>Molossus molossus</i> (Pallas 1766)	Morcego	LC		1	
	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (E. Geoffroy, 1805)	Morcego	LC		1	
Phyllostomidae	<i>Anoura caudifer</i> (Gray, 1838)	Morcego	LC		1; 3	
	<i>Artibeus jamaicensis planirostris</i> (Spix, 1823)	Morcego	LC		1; 3	
	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	Morcego	LC		1; 3	

Tabela 3. Lista de espécies de mamíferos da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Schneider *et al.* 2011, 2. Bonvicino *et al.* 2020, 3. Aguiar 2000, 4. GBIF. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣) (P) - Pegada, (F) - Fezes, (T) - Toca, Resgate (◊), Traps (◎).

Ordem / Família	Espécie	Nome-popular	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB	
Phyllostomidae	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	Morcego	LC		1		
	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus 1758)	Morcego	LC		1; 3		
	<i>Chiroderma doriae</i> (Thomas, 1891)	Morcego	LC		1		
	<i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	Morcego	LC		1		
	<i>Dermanura anderseni</i> (Osgood, 1916)	Morcego	LC		1		
	<i>Dermanura cinereus</i> (Gervais, 1856)	Morcego	LC		1; 3		
	<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	Morcego	LC		1; 3		
	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	Morcego	LC		1; 3; 4		
	<i>Lonchophylla dekeyseri</i> (Taddei, Vizotto & Sazima 1983)	Morcego	EN	EN	1		
	<i>Macrophyllum macrophyllum</i> (Schinz, 1821)	Morcego	LC		1; 3		
	<i>Miconycteris megalotis</i> (Gray, 1842)	Morcego	LC		1		
	<i>Neonycteris pusilla</i> (Sanborn, 1949)	Morcego	DD		1; 3		
	<i>Phyllostomus discolor</i> (Wagner, 1843)	Morcego	LC		1		
	<i>Platyrrhinus brachycephalus</i> (Rouk & Carter, 1972)	Morcego	LC		1		
	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (E. Geoffroy, 1810)	Morcego	LC		1; 4		
	<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	Morcego	LC		1		
	<i>Rhynchonycteris naso</i> (Wied-Neuwied, 1820)	Morcego	LC		1		
	<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy 1810)	Morcego	LC		1; 3		
	Vespertilionidae	<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	Morcego	LC		1	
		<i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny & Gervais, 1847)	Morcego	LC		1; 3	
<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson & Garnot, 1826)		Morcego	LC		1; 3		
<i>Myotis keaysi</i> (J. A. Allen, 1914)		Morcego	LC		1		
<i>Myotis nigricans</i> (Schinz 1821)		Morcego	LC		1		
<i>Myotis riparius</i> (Handley, 1960)		Morcego	LC		1		
Cingulata							
Dasypodidae	<i>Cabassous unicinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-de-rabo-mole; Tatu-de-rabo-mole-pequeno	LC		1; 2; 4	*	
	<i>Dasypus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-galinha	LC		1; 2; 4	❖; ♣; *; ◊; ◎	
	<i>Dasypus septemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatuí	LC		1; 2; 4	♣; *; X; ◊	
	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-peba	LC		1; 2	X; ◊	
	<i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792)	Tatu-canastra	VU	VU	1; 2; 4	♣ (P e T); ◎	

Tabela 3. Lista de espécies de mamíferos da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Schneider *et al.* 2011, 2. Bonvicino *et al.* 2020, 3. Aguiar 2000, 4. GBIF. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣) (P) - Pegada, (F) - Fezes, (T) - Toca, Resgate (◆), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Nome-popular	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Didelphimorphia						
Didelphidae	<i>Caluromys lanatus</i> (Olfers, 1818)	Cuíca-lanosa	LC		2	X; ●
	<i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	Cuíca-d'água	LC		1	
	<i>Cryptonanus agricolai</i> (Moojen, 1943)	Cuíca-pequena	DD		2	
	<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	Gambá, saruê, serué, seriguê	LC		1; 2; 4	❖; ♣; *; X; ◆; ●
	<i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	Cuíca, catita, guaiquíca	LC		1; 2; 4	X
	<i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	Cuíca-graciosa, catita, guaiquíca	LC		1	
	<i>Marmosa murina</i> (Linnaeus, 1758)	Cuíca, marmosa	LC		1	
	<i>Monodelphis americana</i> (Muller, 1776)	Catita, cuíca-três-listras	LC		1; 2	●
	<i>Monodelphis domestica</i> (Wagner, 1842)	Catita	LC		1	
	<i>Monodelphis kunsii</i> (Pine, 1975)	Catita	LC		1; 2	
	<i>Philander canus</i> (Osgood, 1913)				2	
	<i>Philander opossum</i> (Linnaeus, 1758)	Cuíca-de-quatro-olhos	LC		1	
	<i>Thylamys velutinus</i> (Wagner, 1842)	Catita	NT		1; 2	
Lagomorpha						
Leporidae	<i>Sylvilagus minensis</i> Thomas, 1848	Tapiti	EN		1; 2	●
Perissodactyla						
Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Anta	VU	VU	2	*; ♣ (F e P)
Pilosa						
Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamanduá-bandeira	VU	VU	1; 2; 4	❖; ♣; *; X; ♣ (F e P); ◆; ●
	<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamanduá-mirim	LC		1; 2; 4	♣; *; ♣ (P); ◆; ●
Primates						
Atelidae	<i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812)	Bugio-preto; Bugio, guariba, barbado	NT		1; 2; 4	❖; *
Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	Sagui-comum	LC		1	
	<i>Callithrix penicillata</i> (Geoffroy, 1812)	Sagui-do-cerrado; Sagui-de-tufo-preto, soim, mico-estrela	LC		1; 2; 4	❖; ♣; *; X; ◆
Cebidae	<i>Sapajus apella</i> (Linnaeus, 1758)	Macaco-prego	LC		1	*
Rodentia						
Caviidae	<i>Cavia aperea</i> (Erxleben, 1777)	Preá	LC		1; 2	

Tabela 3. Lista de espécies de mamíferos da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Schneider *et al.* 2011, 2. Bonvicino *et al.* 2020, 3. Aguiar 2000, 4. GBIF. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (⊕), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣) (P) - Pegada, (F) - Fezes, (T) - Toca, Resgate (◊), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Nome-popular	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	Capivara	LC		1; 2; 4	⊕; X; ♣ (F e P); ◊; ●
Cricetidae	<i>Akodon cursor</i> (Winge, 1887)	Rato-do-chão	LC		1	
	<i>Akodon lindberghi</i> (Hershkovitz, 1990)	Rato-do-chão	DD		1	
	<i>Akodon montensis</i> (Thomas, 1913)	Rato-do-chão	LC		1	
	<i>Calomys callosus</i> (Rengger, 1830)	Rato-calunga	LC		1	
	<i>Calomys expulsus</i> (Lund, 1841)	Rato-do-chão	LC		2	
	<i>Calomys tener</i> (Winge, 1887)	Rato-calunga	LC		1; 2	
	<i>Cerradomys scotti</i> (Langguth & Bonvicino, 2002)	Rato-do-mato	LC		1; 2	
	<i>Cerradomys subflavus</i> (Wagner, 1842)	Rato-do-mato	LC		1	
	<i>Hylaeamys megacephalus</i> (Fischer, 1814)	Rato-do-mato	LC		1; 2	⊕
	<i>Microakodontomys transitorius</i> (Hershkovitz, 1993)	Rato-do-mato	EN		2	
	<i>Necomys lasiurus</i> (Lund, 1840)	Pixuna	LC		1; 2	
	<i>Nectomys rattus</i> (Pelzeln, 1883)	Rato-d'água	LC		2	
	<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	Rato-d'água	LC		1	
	<i>Oecomys bicolor</i> (Tomes, 1860)	Rato-da-árvore	LC		1	
	<i>Oecomys catherinae</i> (Thomas, 1909)	Rato-da-árvore	LC		2	
	<i>Oecomys cleberi</i> (Locks, 1981)	Rato-da-árvore	DD		2	
	<i>Oecomys concolor</i> (Wagner, 1845)	Rato-da-árvore	LC		1	
	<i>Oligoryzomys eliurus</i> (Wagner, 1845)	Camundongo-do-mato	LC		1	
	<i>Oligoryzomys mottogrossae</i> (Allen, 1916)	Camundongo-do-mato			2	*
	<i>Oligoryzomys microtis</i> (J. A. Allen, 1916)	Camundongo-do-mato	LC		1	
	<i>Oligoryzomys nigripes</i> (Olfers, 1818)	Camundongo-do-mato	LC		1; 2	
	<i>Oxymycterus delator</i> (Thomas, 1903)	Rato-do-brejo	LC		2	
	<i>Oxymycterus roberti</i> (Thomas, 1901)	Rato-do-brejo	LC		1	
	<i>Pseudoryzomys simplex</i> (Winge, 1887)	Rato-do-mato	LC		1	
	<i>Rhipidomys macrurus</i> (Gervais, 1855)	Rato-da-árvore	LC		2	
	<i>Rhipidomys mastacalis</i> (Lund, 1840)	Rato-da-árvore	LC		1; 2	
	<i>Thalpomys cerradensis</i> (Hershkovitz, 1990)	Rato-do-chão	LC	VU	1; 2	
<i>Thalpomys lasiotis</i> (Thomas, 1916)	Rato-do-chão	LC	EN	1; 2		
Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	Paca	LC		1; 2	●

Tabela 3. Lista de espécies de mamíferos da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários:** 1. Schneider *et al.* 2011, 2. Bonvicino *et al.* 2020, 3. Aguiar 2000, 4. GBIF. **Legenda Fonte Dados Primários:** Atropelamento DF-001 (❖), Atropelamento JBB (♣), Avistamento (*), Óbito (X), Rastro (♣) (P) - Pegada, (F) - Fezes, (T) - Toca, Resgate (◊), Traps (●).

Ordem / Família	Espécie	Nome-popular	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados primários JBB
Dasyproctidae	<i>Dasyprocta azarae</i> (Lichtenstein, 1823)	Cutia	DD		1	*; ●
Echimyidae	<i>Euryzgomatomys spinosus</i> (G. Fischer, 1814) (2)	Guirá-do-rio	LC		1	
	<i>Phyllomys centralis</i> (Machado, Loss, Paz, Vieira, Rodrigues & Marinho-Filho, 2018)	Rato-da-árvore			2	
	<i>Proechimys longicaudatus</i> (Rengger, 1830)	Rato-de-espinho	LC		1	
	<i>Proechimys roberti</i> (Thomas, 1901)	Rato-de-espinho	LC		2	
	<i>Thrichomys pachyurus</i> (Wagner, 1845)	Punaré	LC		2	
	<i>Thrichomys apereoides</i> (Lund, 1839)	Rabudo-punaré	LC		1	
Erethizontidae	<i>Coendou longicaudatus boliviensis</i> (Linnaeus, 1758)	Luiz-cacheiro, ouriço	LC		1; 2	♣; *; X; ◊; ●
Muridae	<i>Mus musculus</i> (Linnaeus, 1758)	Camundongo	LC		1	
	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rato, gabiru	LC		1	

- Schneider, M., Alho, C.J.R. & Aguiar, L.M.S. (2011) Contribuição da Reserva Ecológica do IBGE para o conhecimento da mastozoologia do bioma Cerrado. *Reserva Biológica do IBGE-Biodiversidade Terrestre*. Rio de Janeiro: IBGE.
- Bonvicino, C.R., de Araujo Soares, V., Sampaio, R.C. & Bezerra, A.M.R. (2020) Guia de mamíferos não voadores do Jardim Botânico de Brasília, DF, Brasil. *Heringeriana Série Biodiversidade do Jardim Botânico de Brasília* 1. 98p.
- Aguiar, L.M.D.S. (2000) *Comunidades de morcegos do Cerrado no Brasil Central*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 101p
- GBIF: The Global Biodiversity Information Facility (2023) *What is GBIF?* Disponível em: <https://www.gbif.org/what-is-gbif>.

Tabela 4. Lista de espécies de peixes da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. Couto & Aquino 2011, 2. Soares, Y. F. F. (comun. pes. 23 de fev. 2023), 3. Shibatta 2005. **Legenda Fonte Dados Primários:** Avistamento (*).

Ordem / Família	Espécie	Status IUCN	Status MMA	Fonte Dados Secundários	Fonte Dados Primários JBB	Observações
Characiformes						
Characidae	<i>Astyanax</i> sp.			1		
	<i>Bryconamericus stramineus</i> Eigenmann, 1908	NE		1		
	<i>Hasemanina</i> sp.			1		
	<i>Knodus moenkhausii</i> (Eigenmann & Kennedy, 1903)	LC		1		Espécie aparentemente do baixo Paraná (2)
	<i>Moenkhausia</i> sp.			1		
	<i>Piabina argentea</i> Reinhardt, 1867	NE		1		
Crenuchidae	<i>Characidium onca</i> M. R. S. de Melo, M. C. L. de B. Ribeiro & F. C. T. Lima, 2021	CR		1		
	<i>Characidium xanthopterum</i> Silveira, Langeani, Graça, Pavanelli & Buckup, 2008	LC		1		
	<i>Characidium zebra</i> Eigenmann, 1909	NE		1		
	<i>Planaltina myersi</i> Böhlke, 1954	LC		1		
Erythrinidae	<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	LC		1		
Cyprinodontiformes						
Poeciliidae	<i>Phalloceros harpagos</i> Lucinda, 2008	LC		1		
	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	LC		1		Exótica, registrada em outro local da APA (2)
Rivulidae	<i>Melanorivulus pictus</i> (Costa, 1989)	LC		1		
	<i>Simpsonichthys boitonei</i> Carvalho, 1959	VU	CR	3	*	
Gymnotiformes						
Gymnotidae	<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	LC		1		
Siluriformes						
Loricariidae	<i>Hypostomus ancistroides</i> (Ihering, 1911)	LC		1		
	<i>Hypostomus</i> sp.1			1		
	<i>Hypostomus</i> sp.2			1		
	<i>Hypostomus</i> sp.3			1		
	<i>Hypostomus</i> sp.4			1		
	<i>Microlepidogaster longicollis</i> Calegari & Reis, 2010	LC		1		
	<i>Neoplecostomus corumba</i> Zawadzki, Pavanelli & Langeani, 2008	LC		1		

- Couto, T.B.A. & Aquino, P.D.P.U. (2011) Structure and integrity of fish assemblages in streams associated to conservation units in Central Brazil. *Neotropical Ichthyology* 9 (2): 445–454. <https://doi.org/10.1590/S1679-62252011000200023>
- Soares, Y.F.F. (2023) Comunicação pessoal em 23 Fev 2023.
- Shibatta, O.A. (2005) Reprodução do pirá-brasília, *Simpsonichthys boitonei* Carvalho (Cyprinodontiformes, Rivulidae), e caracterização de seu habitat na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasília, Distrito Federal, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22 (4): 1146–1151. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752005000400048>

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
HESPERIIDAE					
Eudaminae					
Entheini					
<i>Phanus australis</i> L. Miller, 1965				2	
<i>Udranomia kikkawai</i> (Weeks, 1906)				1; 2; 3	
<i>Udranomia spitzzi</i> (Hayward, 1942)				2; 3	
Eudamini					
<i>Aguna albistria albistria</i> (Plötz, 1880)			*	2; 3	
<i>Aguna asander asander</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Aguna aurunce hypozonius</i> (Plötz, 1880)			*	2; 3	
<i>Astraptes fulgerator fulgerator</i> (Walch, 1775)	<i>Telegonus fulgerator</i> (Walch, 1775)			2; 3	
<i>Astraptes talus</i> (Cramer, 1777)	<i>Telegonus talus</i> (Cramer, 1777)			3	
<i>Autochton integrifascia</i> (Mabille, 1891)				2; 3	
<i>Autochton itylus</i> Hübner, 1823			*	2; 3	
<i>Autochton neis</i> (Geyer, 1832)				2; 3	
<i>Autochton zarex</i> (Hübner, 1818)	<i>Cecropterus zarex</i> (Hübner, 1818)			2; 3	
<i>Chioides catillus albius</i> Evans, 1952			*		
<i>Chioides catillus catillus</i> (Cramer, 1779)				2; 3	
<i>Epargyreus exadeus exadeus</i> (Cramer, 1779)			*	2; 3	
<i>Polythrix octomaculata octomaculata</i> (Sepp, [1844])	<i>Ectomis octomaculata</i> (Sepp, [1844])			3	
<i>Polythrix octomaculata octomaculata</i> (Sepp, [1844])	<i>Ectomis octomaculata</i> (Sepp, [1844])			2	
<i>Proteides mercurius mercurius</i> (Fabricius, 1787)				2; 3	
<i>Spathilepia clonius</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Telemiades amphion misitheus</i> (Mabille, 1878)	<i>Telemiades amphion</i> (Geyer, 1832) <i>Telemiades misitheus</i> Mabille, 1888			3	
<i>Urbanus cindra</i> Evans, 1952	<i>Spicauda cindra</i> (Evans, 1952)		*	2; 3	
<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	<i>Cecropterus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)		*	2; 3	
<i>Urbanus doryssus doryssus</i> (Swainson, 1831)	<i>Cecropterus doryssus doryssus</i> (Swainson, 1831)			2; 3	
<i>Urbanus esmeraldus</i> (Butler, 1877)			*	2	
<i>Urbanus esta</i> Evans, 1952				3	
<i>Urbanus evenus</i> (Ménétriés, 1855)	<i>Cecropterus evenus</i> (Ménétriés, 1855)			2; 3	
<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	<i>Spicauda procne</i> (Plötz, 1881)			3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Eudamini					
<i>Urbanus proteus proteus</i> (Linnaeus, 1758)				1; 2; 3	
<i>Urbanus simplicius</i> (Stoll, 1790)	<i>Spicauda simplicius</i> (Stoll, 1790)		*	2; 3	
<i>Urbanus teleus</i> (Hubner, 1821)	<i>Spicauda teleus</i> (Hübner, 1821)		*	2; 3	
Oileidini					
<i>Cogia calchas</i> (Herrich-Schäffer, 1869)			*	2; 3	
<i>Cogia cerradicola</i> (Mielke, 1967)				2; 3	End. 4
<i>Cogia grandis</i> Riley, 1921				2; 3	End. 4
<i>Cogia hassan evansi</i> Bell, 1937				2; 3	
<i>Typhedanus undulatus</i> (Hewitson, 1867)	<i>Cogia undulatus</i> (Hewitson, 1867)			2; 3	
Phocidini					
<i>Bungalotis erythus</i> (Cramer, 1775)				3	
<i>Phocides polybius</i> Fabricius, 1793				1	
<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)				2; 3	
<i>Sarmientoia almeidai</i> Mielke, 1967			*	2; 3	End. 4
Hesperinae					
Hesperiini					
<i>Anthoptus epictetus</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Anthoptus insignis</i> (Plötz, 1882)				2; 3	
<i>Apaustus gracilis</i> ssp. n. (C. Felder & R. Felder, 1867)				3	
<i>Argon lota</i> (Hewitson, 1877)	<i>Carystus lota</i> (Hewitson, 1877)			2; 3	
<i>Artines acroleuca</i> Plötz, 1884	<i>Panca acroleuca</i> (Plötz, 1884)			2; 3	
<i>Artines bipunctata</i> Mielke, 1968				2; 3	End. 4
<i>Callimormus corades</i> (C. Felder, 1862)				2; 3	
<i>Callimormus juvenis</i> Scudder, 1872				2; 3	
<i>Callimormus radiola pusillus</i> Hayward, 1934				3	End. 4
<i>Callimormus saturnus</i> (Herrich-Schäffer, 1869)				2; 3	
<i>Calpodes ethlius</i> (Stoll, 1782)				2; 3	
<i>Chalcone briquenydan briquenydan</i> (Weeks, 1901)	<i>Metrocles briquenydan briquenydan</i> (Weeks, 1901)			2; 3	
<i>Cobalopsis cocalus</i> (Hayward, 1939)				2; 3	
<i>Cobalopsis miaba</i> (Schaus, 1902)				3	
<i>Cobalopsis nero</i> (Herrich-Schäffer, 1869)			*	2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Hesperiini					
<i>Conga chydaea</i> (Butler, 1877)				2; 3	
<i>Copaeodes castanea</i> Mielke, 1969	<i>Oarisma castanea</i> (O. Mielke, 1969)			2; 3	
<i>Corticea lysias potex</i> Evans, 1955				3	
<i>Cumbre belli eberti</i> Evans, 1955	<i>Rufocumbre eberti</i> (Evans, 1955)			2; 3	
<i>Cymaenes alumna</i> (Butler, 1877)				2; 3	
<i>Cymaenes chela</i> Evans, 1955				3	
<i>Cymaenes gisca</i> Evans, 1955				2; 3	
<i>Cymaenes lepta</i> (Hayward, 1939)				2; 3	
<i>Cymaenes tripunctus theogenis</i> (Capronnier, 1874)				2; 3	
<i>Cynea diluta</i> (Herrich-Schäffer, 1869)				3	
<i>Flaccilla aecae</i> (Stoll, 1781)				2	
<i>Justinia justinianus justinianus</i> (Latreille, [1824])				3	
<i>Lerema lineosa</i> (Herrich-Schäffer, 1865)			*	2; 3	
<i>Lerema veadeira</i> Mielke, 1968	<i>Veadda veadeira</i> (O. Mielke, 1968)			2; 3	End. 4
<i>Lerodea erythrostictus</i> (Prittwitz, 1868)				2; 3	
<i>Lerodea eufala eufala</i> (Edwards, 1869)			*	3	
<i>Lucida lucia</i> (Capronnier, 1874)				3	
<i>Methionopsis ina</i> (Plötz, 1882)	<i>Mnasinous ina</i> (Plötz, 1882)			2; 3	
<i>Mnaseas bicolor inca</i> Bell, 1930	<i>Mnaseas bicolor</i> (Mabille, 1889) <i>Mnaseas inca</i> E. Bell, 1930			2; 3	
<i>Mnasilus allubita</i> (Butler, 1877)	<i>Papias allubita</i> (A. Butler, 1877)			2	
<i>Morys geisa geisa</i> (Möschler, 1878)	<i>Lerema geisa</i> (Möschler, 1879)			3	
<i>Morys subgrisea subgrisea</i> (Mabille, 1898)	<i>Lerema subgrisea subgrisea</i> (Mabille, 1898)			2; 3	
<i>Nyctelius nyctelius nyctelius</i> (Latreille, [1824])				1; 2; 3	
<i>Oxyntes corusca</i> (Herrich-Schäffer, 1869)				3	
<i>Panoquina bola</i> E. Bell, 1942			*	2; 3	
<i>Panoquina chapada</i> Evans, 1955				3	End. 4
<i>Panoquina hecebolus</i> (Scudder, 1872)				2; 3	
<i>Panoquina lucas lucas</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Papias subcostulata</i> (Herrich-Schäffer, 1870)				2; 3	
<i>Polites vibex catilina</i> (Plötz, 1886)	<i>Hedone vibex</i> (Geyer, 1832) <i>Hedone catilina</i> (Plötz, 1886)		*	2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Hesperiini					
<i>Pompeius amblyspila</i> (Mabille, 1898)				2; 3	
<i>Pompeius pompeius</i> (Latreille, [1824])			*	1; 2; 3	
<i>Pompeius postpuncta</i> (Draudt, 1923)	<i>Pompe postpuncta</i> (Draudt, 1923)			3	
<i>Pseudosarbia flavofasciata</i> Skinner, 1921				3	End. 4
<i>Quinta locutia</i> (Hewitson, 1876)	<i>Oligoria locutia</i> (Hewitson, 1876)			3	
<i>Remella remus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Mnasicles remus</i> (Fabricius, 1798)			2; 3	
<i>Saliana longirostris</i> (Sepp, [1840])	<i>Calpodes longirostris</i> (Sepp, [1840])			3	
<i>Sodalia coler</i> (Schaus, 1902)				2; 3	
<i>Synale elana elana</i> (Plötz, 1882)	<i>Carystus elana elana</i> (Plötz, 1882)			2	
<i>Synale hylaspes</i> (Stoll, 1781)	<i>Carystus hylaspes</i> (Stoll, 1781)		*	1; 2; 3	
<i>Synale metella</i> (Plötz, 1882)	<i>Carystus metella</i> (Plötz, 1882)			2; 3	
<i>Vehilius inca</i> (Scudder, 1872)			*	2; 3	
<i>Vehilius stictomenes stictomenes</i> (Butler, 1877)				1; 2; 3	
<i>Vettius artona</i> (Hewitson, 1868)	<i>Artonia artona</i> (Hewitson, 1868)			2; 3	
<i>Vettius lafrenaye lafrenaye</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	<i>Vettius lafrenaye pica</i> (Herrich-Schäffer, 1869) <i>Vettius lafrenaye lafrenaye</i> (Latreille, [1824])			2; 3	
<i>Vettius lucretius</i> (Latreille, [1824])	<i>Mielkeus lucretius</i> (Latreille, [1824])		*	1; 2; 3	
<i>Vettius marcus marcus</i> (Fabricius, 1787)				2	
<i>Vettius richardi</i> (Weeks, 1906)				2; 3	
<i>Vidius felus</i> Mielke, 1968				2; 3	
<i>Vidius spitzii</i> Mielke, 1967				2; 3	
<i>Vidius vidius</i> (Mabille, 1891)				3	
<i>Wallengrenia otho sapuca</i> Evans, 1955	<i>Polites otho</i> (J. E. Smith, 1797) <i>Polites sapuca</i> (Evans, 1955)			2; 3	
<i>Wallengrenia premnas</i> (Wallengren, 1860)	<i>Polites premnas</i> (Wallengren, 1860)			2; 3	
<i>Xeniades chalestra chalestra</i> (Hewitson, 1866)			*	2; 3	
<i>Xeniades orchamus</i> (Cramer, 1777)				2; 3	
<i>Zariaspes mys</i> (Hübner, [1808])				2; 3	
Megathymini					
<i>Carystoides basoches</i> (Latreille, [1824])				2; 3	
Pericharini					
<i>Orses cynisca</i> (Swainson, 1821)				2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Pericharini					
<i>Perichares philetes</i> (Gmelin, [1790])			*		
<i>Perichares philetes adela</i> (Hewitson, 1867)	<i>Perichares philetes</i> (Gmelin, [1790]) <i>Perichares adela</i> (Hewitson, 1867)			2; 3	
<i>Perichares seneca seneca</i> (Latreille, [1824])				3	
Pyrginae					
Achlyodini					
<i>Achlyodes mithridates thraso</i> (Hübner, [1807])	<i>Eantis mithridates</i> (Fabricius, 1793) <i>Eantis thraso</i> (Hübner, [1807])			2; 3	
<i>Eantis thraso</i> (Hübner, [1807])			*	1	
<i>Gindanes brebisson brebisson</i> (Latreille, [1824])				2	
<i>Gindanes brontinus bronta</i> Evans, 1953				2; 3	
<i>Grais stigmaticus</i> (Mabille, 1883)				2; 3	
<i>Ouleus fridericus candangus</i> Mielke, 1968				2; 3	End. 4
<i>Pythonides jovianus fabricii</i> Kirby, 1871				2; 3	
<i>Quadrus cerialis</i> (Stoll, 1782)				3	
<i>Quadrus jacobus</i> (Plötz, 1884)				3	
<i>Zera hyacinthinus</i> ssp. (Mabille, 1877)				3	
Carcharodini					
<i>Nisoniades castolus</i> (Hewitson, 1878)				2; 3	
<i>Nisoniades macarius</i> (Herrich-Schäffer, 1870)				2; 3	
<i>Pachyneuria inops</i> (Mabille, 1877)				3	
<i>Sophista latifasciata</i> (Spitz, 1930)			*	1; 2; 3	End. 4
<i>Staphylus melangon epicaste</i> Mabille, 1903				2; 3	End. 4
<i>Viola violella</i> (Mabille, 1898)			*	2; 3	
Erynnini					
<i>Chiomara asychis autander</i> (Mabille, 1891)	<i>Chiothion asychis autander</i> (Mabille, 1891)			2; 3	
<i>Chiomara basigutta</i> (Plötz, 1884)	<i>Chiothion basigutta</i> (Plötz, 1884)			2; 3	
<i>Clito bibulus</i> (Riley, 1929)				2; 3	End. 4
<i>Clito sompa</i> Evans, 1953				2; 3	
<i>Cycloglypha polax</i> Evans, 1953				2; 3	
<i>Cycloglypha thrasibulus thrasibulus</i> (Fabricius, 1793)			*	2; 3	
<i>Ebrietas anacreon anacreon</i> (Staudinger, 1876)				2	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Erynnini					
<i>Ebrietas anacreon anacreon</i> (Staudinger, 1876)				2; 3	
<i>Erynnis (Erynnides) funeralis</i> (Scudder & Burgess, 1870)	<i>Gesta funeralis</i> (Scudder & Burgess, 1870)			2; 3	
<i>Gesta austerus</i> (Schaus, 1902)				2; 3	
<i>Gesta gesta</i> (Herrich-Schäffer, 1863)				2; 3	
<i>Gesta heteropterus</i> (Plötz, 1884)				2; 3	
<i>Gorgythion begga begga</i> (Prittwitz, 1868)			*	2; 3	
<i>Gorgythion beggina escalophoides</i> (Hayward, 1941)			*	2; 3	
<i>Helias phalaenoides palpalis</i> (Latreille, [1824])				2; 3	
<i>Mylon pelopidas</i> (Fabricius, 1793)	<i>Hoodus pelopidas</i> (Fabricius, 1793)			2; 3	
<i>Sostrata bifasciata bifasciata</i> (Ménétriés, 1829)				3	
<i>Theagenes dichrous</i> (Mabille, 1878)				2; 3	
<i>Timochares trifasciata trifasciata</i> (Hewitson, 1868)			*	2; 3	
Pyrgini					
<i>Anastrus sempiternus simplicior</i> (Möschler, 1877)	<i>Echelatus sempiternus simplicior</i> (Möschler, 1877)			2; 3	
<i>Anisochoria pedalioidina extincta</i> Hayward, 1933	<i>Anisochoria pedalioidina</i> (A. Butler, 1870) <i>Anisochoria extincta</i> Hayward, 1933			2; 3	
<i>Anisochoria sublimbata</i> Mabille, 1883				2; 3	
<i>Antigonus erosus</i> (Hübner, [1812])				3	
<i>Antigonus liborius liborius</i> Plötz, 1884	<i>Paches liborius liborius</i> (Plötz, 1884)			3	
<i>Heliopetes alana</i> (Reakirt, 1868)			*	2; 3	
<i>Heliopetes arsalte</i> (Linnaeus, 1758)			*	1; 2; 3	
<i>Heliopetes macaira orbiger</i> (Mabille, 1888)	<i>Heliopetes macaira</i> (Reakirt, [1867]) <i>Heliopetes orbiger</i> (Mabille, 1888)			2; 3	
<i>Heliopetes omrina</i> (Butler, 1870)				2; 3	
<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	<i>Burnsius orcus</i> (Stoll, 1780)		*	2; 3	
<i>Quadrus u-lucida</i> (Plötz, 1884)				2; 3	
<i>Trina geometrina geometrina</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)				3	
<i>Xenophanes tryxus</i> (Stoll, 1780)			*	1; 2; 3	
<i>Zopyrion evenor evenor</i> Godman, 1901				2; 3	
<i>Zopyrion reticulata</i> Hayward, 1942				2; 3	
Pyrrhopyginae					
Pyrrhopygini					

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Pyrrhopygini					
<i>Elbella azeta giffordi</i> Mielke, 1995	<i>Microceris azeta giffordi</i> (O. Mielke, 1995)			3	End. 4
<i>Elbella intersecta losca</i> Evans, 1951	<i>Microceris intersecta losca</i> (Evans, 1951)			2; 3	
<i>Elbella luteizona</i> (Mabille, 1877)	<i>Microceris luteizona</i> (Mabille, 1877)			2; 3	
<i>Jemadia menechmus</i> (Mabille, 1878)			*	2; 3	
<i>Microceris variicolor</i> (Ménétriés, 1855)				2; 3	
<i>Mimoniades versicolor versicolor</i> (Latreille, [1824])				2; 3	
<i>Mysoria barcastus</i> (Sepp, [1851])			*		
<i>Mysoria barcastus barta</i> Evans, 1951			*	2; 3	
<i>Pyrrhopyge charybdis charybdis</i> Westwood, 1852				2; 3	
<i>Pyrrhopyge pelota</i> Plötz, 1879			*	2; 3	
<i>Pyrrhopyge sergius</i> (Hopffer, 1874)				2; 3	
Tagiadinae					
Celaenorrhinini					
<i>Celaenorrhinus similis</i> Hayward, 1933				3	
LYCAENIDAE					
Polyommatainae					
<i>Elkalyce cogina</i> (Schaus, 1902)			*	3	
<i>Hemiargus hanno</i> (Stoll, 1790)			*	2; 3	
<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)			*	2; 3	
<i>Zizula cyna</i> (Edwards, 1881)				3	
Theclinae					
Eumaeini					
<i>Allosmaitia strophius</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Arawacus aetolus</i> (Sulzer, 1776)				2; 3	
<i>Arawacus ellida</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Arawacus tarania</i> (Hewitson, 1868)			*	2; 3	
<i>Arcas imperialis</i> (Cramer, 1775)				2	
<i>Arumecla galliena</i> (Hewitson, 1877)				3	
<i>Bistonina mantica</i> (Druce, 1907)			*	2; 3	End. 4
<i>Brangas getus</i> (Fabricius, 1787)			*		
<i>Calycopis anthora</i> (Hewitson, 1877)				3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Eumaeini					
<i>Calycopis calor</i> (Druce, 1907)				2; 3	
<i>Calycopis caulonia</i> (Hewitson, 1869)				2; 3	
<i>Calycopis cissusa</i> (Hewitson, 1877)				2; 3	
<i>Calycopis demonassa</i> (Hewitson, 1868)				2; 3	
<i>Celmia celmus</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Chalybs jantias</i> (Cramer, 1779)				2; 3	
<i>Chlorostrymon telea</i> Hewitson, 1868				2; 3	
<i>Contrafacia imma</i> (Prittwitz, 1865)				3	
<i>Contrafacia muattina</i> (Schaus, 1902)				3	
<i>Cyanophrys amyntor</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Cyanophrys herodotus</i> (Fabricius, 1793)				3	
<i>Electrostrymon endymion</i> Fabricius, 1775				2; 3	
<i>Evenus regalis</i> (Cramer, 1775)				1; 2	
<i>Evenus satyroides</i> (Hewitson, 1865)				3	
<i>Gargina emessa</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Gargina gnosis</i> (Hewitson, 1868)				1	
<i>Ignata mulsus</i> (Druce, 1907)				2; 3	
<i>Lamprospilus badaca</i> (Hewitson, 1868)	<i>Badecla badaca</i> (Hewitson, 1868)			3	
<i>Magnastigma elsa</i> (Hewitson, 1877)				3	
<i>Magnastigma julia</i> Nicolay, 1977		EN		2; 3	End. 4
<i>Michaelus thordesa</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Ministrymon azia</i> (Hewitson, 1873)			*	2; 3	
<i>Ministrymon cleon</i> (Fabricius, 1775)				2; 3	
<i>Ministrymon megacles</i> (Stoll, 1780)				3	
<i>Ministrymon phrutus</i> (Geyer, 1832)				3	
<i>Ministrymon una</i> (Hewitson, 1873)				3	
<i>Nicolaea bagrada</i> (Hewitson, 1868)				3	
<i>Nicolaea besidia</i> (Hewitson, 1868)				2; 3	
<i>Nicolaea cauter</i> (Druce, 1907)				2; 3	
<i>Nicolaea ophia</i> (Hewitson, 1868)				2; 3	
<i>Nicolaea socia</i> (Hewitson, 1868)				2; 3	End. 4

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Eumaeini					
<i>Ocaria ocrisia</i> (Hewitson, 1868)				2; 3	
<i>Oenomaus cortica</i> (D'Abrera, 1995)				2; 3	
<i>Olynthus essus</i> (Herrich-Schäffer, [1853])				2; 3	
<i>Ostrinotes sophocles</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Paiwarria aphaca</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Panthiades hebraeus</i> (Hewitson, 1867)			*	1; 2; 3	
<i>Panthiades phaleros</i> (Linnaeus, 1767)				2; 3	
<i>Parrhasius orgia</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Parrhasius polibetes</i> (Stoll, 1781)			*	1; 2; 3	
<i>Pseudolycaena marsyas</i> (Linnaeus, 1758)				1; 2; 3	
<i>Rekoa marius</i> (Lucas, 1857)				1; 2; 3	
<i>Rekoa meton</i> (Cramer, 1779)				3	
<i>Rekoa palegon</i> (Cramer, 1780)				2; 3	
<i>Strephonota sphinx</i> (Fabricius, 1775)				3	
<i>Strymon astiocha</i> (Prittwitz, 1865)				1; 2; 3	
<i>Strymon bazochii</i> (Godart, 1824)				2; 3	
<i>Strymon bubastus</i> (Stoll, 1780)				2; 3	
<i>Strymon cestri</i> (Reakirt, [1867])				2; 3	
<i>Strymon crambusa</i> (Hewitson, 1874)				2; 3	
<i>Strymon eurytulus</i> (Hübner, [1819])				2; 3	
<i>Strymon mulucha</i> (Hewitson, 1867)			*	1; 2; 3	
<i>Strymon rufofusca</i> (Hewitson, 1877)				2	
<i>Strymon tegaea</i> (Hewitson, 1868)				2; 3	End. 4
<i>Strymon ziba</i> (Hewitson, 1868)				3	
<i>Symbiopsis lenitas</i> (Druce, 1907)				2; 3	End. 4
<i>Theclopsis gargara</i> (Hewitson, 1868)				3	
<i>Theclopsis lydus</i> (Hübner, [1819])				3	
<i>Thepytus thyrea</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
<i>Thereus praxis</i> (Godman & Salvin, 1887)				2; 3	
<i>Theritas hemon</i> (Cramer, 1775)	<i>Denivia hemon</i> (Cramer, 1775)			2; 3	
<i>Theritas triquetra</i> (Hewitson, 1865)				2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Eumaeini					
<i>Tmolus cydrara</i> (Hewitson, 1868)				3	
<i>Tmolus echion</i> (Linnaeus, 1767)				2; 3	
<i>Tmolus venustus</i> (Druce, 1907)			*	2; 3	
<i>Ziegleria perisus</i> (Druce, 1907)	<i>Pendantus perisus</i> (H. Druce, 1907)			2; 3	
<i>Ziegleria syllis</i> (Godman & Salvin, 1877)	<i>Kisutam syllis</i> (Godman & Salvin, 1887)			2; 3	
NYMPHALIDAE					
Apaturinae					
<i>Doxocopa laurentia</i> (Godart, [1824])				2; 3	
Biblidinae					
Ageroniini					
<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)			*	2; 3	
<i>Hamadryas chloe rhea</i> (Fruhstorfer, 1907)			*	2; 3	
<i>Hamadryas februa</i> (Hübner, [1823])			*	2; 3	
<i>Hamadryas feronia feronia</i> (Linnaeus, 1758)			*	2; 3	
<i>Hamadryas iphthime iphthime</i> (Bates, 1864)				3	
<i>Hamadryas laodamia laodamia</i> (Cramer, 1777)				2; 3	
Biblidini					
<i>Biblis hyperia nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909)				2; 3	
<i>Mestra dorcas</i> (Fabricius, 1775)			*		
<i>Mestra dorcas apicalis</i> (Staudinger, 1886)	<i>Mestra hersilia apicalis</i> (Staudinger, 1886)			2; 3	
Callicorini					
<i>Callicore astarte selima</i> (Guenée, 1872)			*	1; 2; 3	
<i>Callicore sorana sorana</i> (Godart, [1824])			*	1; 2; 3	
<i>Diaethria clymena janeira</i> (C. Felder, 1862)				2; 3	
<i>Diaethria eluina eluina</i> (Hewitson, [1855])			*	2; 3	End. 4
Catonephelini					
<i>Catonephele acontius</i> (Linnaeus, 1771)				1	
<i>Catonephele acontius caeruleus</i> Jenkins, 1985			*	2; 3	
<i>Catonephele numilia penthia</i> (Hewitson, 1852)				2; 3	
<i>Eunica bechina</i> (Hewitson, 1852)			*	1; 2; 3	
<i>Eunica cuvieri</i> (Godart, 1819)			*	1; 2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Catonephelini					
<i>Eunica eburnea</i> Fruhstorfer, 1907				3	
<i>Eunica tatila</i> (Herrich & Schäffer, [1855])				1	
<i>Eunica tatila bellaria</i> Fruhstorfer, 1908			*	2; 3	
<i>Eunica volumna volumna</i> (Godart, [1824])			*	2; 3	
Epiphelini					
<i>Epiphile orea</i> (Hübner, [1823])				2; 3	
<i>Nica flavilla flavilla</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Temenis huebneri korallion</i> Fruhstorfer, 1912			*	2; 3	
<i>Temenis laothoe</i> (Cramer, 1777)				1; 3	
<i>Temenis laothoe bahiana</i> Fruhstorfer, 1907				2	
<i>Temenis laothoe meridionalis</i> Ebert, 1965			*	2	
Eubagini					
<i>Dynamine agacles agacles</i> (Dalman, 1823)			*	2; 3	
<i>Dynamine postverta postverta</i> (Cramer, 1779)				3	
<i>Dynamine tithia tithia</i> (Hübner, [1823])				3	
Charaxinae					
Anaeini					
<i>Fountainea glycerium</i> (E. Doubleday, [1849])				1	
<i>Fountainea glycerium cratais</i> (Hewitson, 1874)				2; 3	
<i>Fountainea ryphea</i> (Cramer, 1775)				1	
<i>Fountainea ryphea phidile</i> (Geyer, 1837)			*	2; 3	
<i>Memphis acidalia</i> (Hübner, [1819])				1	
<i>Memphis acidalia victoria</i> (Druce, 1877)				2; 3	
<i>Memphis moruus</i> (Fabricius, 1775)				1	
<i>Memphis moruus stheno</i> (Prittwitz, 1865)			*	2; 3	
<i>Siderone galanthis</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Siderone galanthis galanthis</i> (Cramer, 1775)			*	1	
<i>Zaretis isidora</i> (Cramer, 1779)			*	1; 2; 3	
Preponini					
<i>Agrias claudina godmani</i> Fruhstorfer, 1895	<i>Prepona claudina godmani</i> (Fruhstorfer, 1895)			2; 3	End. 4
<i>Archaeoprepona amphiachus amphiachus</i> (Fabricius, 1775)				2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Preponini					
<i>Archaeoprepona demophon thalpius</i> (Hubner, [1814])			*	1; 2; 3	
<i>Archaeoprepona demophoon antimache</i> (Hübner, [1819])				2; 3	
<i>Prepona claudina godmani</i> (Fruhstofer, 1895)			*		
<i>Prepona dexamenus dexamenus</i> Hopffer, 1874				3	
<i>Prepona laertes</i> (Hübner, [1811])				1	
<i>Prepona laertes demodice</i> (Godart, [1824])			*	2; 3	
<i>Prepona pheridamas</i> (Cramer, 1777)	<i>Mesoprepona pheridamas</i> (Cramer, 1777)		*	3	
Cyrestinae					
Cyrestini					
<i>Marpesia chiron</i> (Fabricius, 1775)				2; 3	
<i>Marpesia chiron chiron</i> (Fabricius, 1775)			*	1	
<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)			*	1	
<i>Marpesia petreus petreus</i> (Cramer, 1776)				1; 2; 3	
Danaïnae					
Danaini					
<i>Danaus eresimus plexaure</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Danaus gilippus gilippus</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Lycorea halia discreta</i> Haensch, 1909				2; 3	
Ithomiini					
<i>Aeria elara elarina</i> (Oberthür, 1879)			*	2; 3	
<i>Aeria olena</i> Weymer, 1875				3	
<i>Brevioleria aelia plisthenes</i> (d'Almeida, 1958)				2; 3	
<i>Brevioleria seba emyra</i> (Haensch, 1905)				3	End. 4
<i>Dircenna dero dero</i> (Hübner, 1823)			*	1; 2; 3	
<i>Episcada hymenaea centralis</i> (Brown & Mielke 1970)				2; 3	
<i>Greta morgane</i> Geyer, 1833				1	
<i>Heterosais edessa</i> (Hewitson, [1855])			*	2; 3	
<i>Hypoleria alema consimilis</i> Talbot, 1928			*		
<i>Hypoleria lavinia consimilis</i> Talbot, 1928	<i>Hypoleria lavinia</i> (Hewitson, [1855])			2; 3	End. 4
<i>Hypoleria sarepta goiana</i> d'Almeida, 1951			*	1; 2; 3	End. 4

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Ithomiini					
<i>Hypothyris euclea laphria</i> (Doubleday, 1847)				3	
<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)				2; 3	
<i>Ithomia agnosia agnosia</i> (Hewitson, [1855])			*	2; 3	
<i>Mcclungia cymo salonina</i> (Hewitson, 1855)				2; 3	
<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905			*	1; 2; 3	
<i>Mechanitis polymnia</i> Linnaeus, 1758				1	
<i>Methona themisto</i> (Hubner, 1818)			*	1; 2; 3	
<i>Oleria aquata</i> (Weymer, 1875)				2; 3	
<i>Placidina euryanassa</i> (C. Felder & R. Felder, 1860)	<i>Pagyris euryanassa</i> (C. Felder & R. Felder, 1860)			3	
<i>Pseudoscada acilla quadrifasciata</i> Talbot, 1928				2; 3	End. 4
<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)				2; 3	
<i>Thyridia psidii hippodamia</i> (Fabricius, 1775)			*	2; 3	
<i>Tithorea harmonia pseudethra</i> Butler, 1873				2; 3	
Heliconiinae					
Acraeini					
<i>Actinote pellenea pellenea</i> Hübner, [1821]			*	1; 2; 3	
<i>Actinote carycina</i> Jordan, 1913				2; 3	
<i>Actinote discrepans</i> d'Almeida 1958				2; 3	
<i>Actinote melanisans</i> Oberthür, 1917				2	
<i>Actinote parapeles</i> Jordan, 1913				2; 3	
<i>Actinote rhodope</i> d'Almeida, 1923				3	
<i>Actinote surima surima</i> (Schaus, 1902)			*	2; 3	
Argynnini					
<i>Euptoieta hegesia meridiania</i> (Stichel, 1938)			*	2; 3	
Heliconiini					
<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	<i>Dione vanillae</i> (Linnaeus, 1758) <i>Dione maculosa</i> Stichel, [1908]		*	2; 3	
<i>Dione junio suffumata</i> (Brown & Mielke, 1972)				2; 3	
<i>Dryadula phaetusa</i> (Linnaeus, 1758)				2; 3	
<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775) <i>Dryas alcionea</i> (Cramer, 1779)			2; 3	
<i>Dryas iulia</i> Fabricius, 1775				1	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Heliconiini					
<i>Eueides aliphera aliphera</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Eueides isabella</i> (Stoll, 1781)				1	
<i>Eueides isabella dianasa</i> (Hübner, [1806])				2; 3	
<i>Heliconius besckei</i> (Ménétriés, 1857)			*	1; 2; 3	
<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1758)				1	
<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)			*	2; 3	
<i>Heliconius ethilla</i> (Godart, 1819)				1	
<i>Heliconius ethilla narcaea</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Heliconius melpomene</i> (Linnaeus, 1758)				1	
<i>Heliconius melpomene burchelli</i> Poulton, 1910			*	2; 3	
<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)				1	
<i>Heliconius sara thamar</i> (Hübner, [1806])	<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)		*	2; 3	
Libytheinae					
<i>Libytheana carinenta</i> (Cramer, 1777)				2; 3	
Limenitidinae					
Limenitidini					
<i>Adelpha abia</i> (Hewitson, 1850)				3	
<i>Adelpha capucinus capucinus</i> (Walch, 1775)				2	
<i>Adelpha cytherea</i> (Linnaeus, 1758)			*	1	
<i>Adelpha cytherea aea</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)				2; 3	
<i>Adelpha iphicles ephesa</i> (Ménétriés, 1857)				2; 3	
<i>Adelpha malea aethalia</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)				3	
<i>Adelpha paraena paraena</i> (Bates, 1865)				2; 3	
<i>Adelpha plesaura</i> Hübner, 1823			*		
<i>Adelpha plesaura phliassa</i> (Godart [1824])				2; 3	
<i>Adelpha thoasa gerona</i> (Hewitson, 1867)				2; 3	
Nymphalinae					
Coeini					
<i>Historis acheronta acheronta</i> (Fabricius, 1775)				2; 3	
<i>Historis odius dious</i> Lamas, 1995				3	
<i>Historis odius odius</i> (Fabricius, 1775)			*	1; 2	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Junoniini					
<i>Junonia evarete evarete</i> (Cramer, 1779)			*	1; 2; 3	
Melitaeini					
<i>Anthanassa frisia hermas</i> (Hewitson, 1864)	<i>Anthanassa frisia</i> (Poey, 1832) <i>Anthanassa hermas</i> (Hewitson, 1864)			3	
<i>Chlosyne lacinia</i> (Geyer, 1837)				1	
<i>Chlosyne lacinia saundersi</i> (Doubleday, [1847])			*	2; 3	
<i>Eresia eunice esora</i> Hewitson, 1857				2; 3	
<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Ortilia dicoma</i> (Hewitson, 1864)	<i>Notilia dicoma</i> (Hewitson, 1864)			2; 3	
<i>Ortilia ithra</i> (Kirby, 1900)	<i>Ithra ithra</i> (W. F. Kirby, 1900)			2; 3	
<i>Ortilia sejona</i> (Schaus, 1902)	<i>Notilia sejona</i> (Schaus, 1902)			2; 3	
<i>Phystis simois</i> (Hewitson, 1864)			*	1	End. 4
<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)			*	2; 3	
Nymphalini					
<i>Colobura dirce dirce</i> (Linnaeus, 1758)			*	1; 2; 3	
<i>Hypanartia lethe</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Smyrna blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)				1	
<i>Smyrna blomfieldia blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)				2; 3	
<i>Tigridia acesta latifascia</i> (Butler, 1873)				2; 3	
<i>Vanessa braziliensis</i> (Moore, 1883)				2; 3	
<i>Vanessa myrinna</i> (Doubleday, 1849)			*	1; 2; 3	
Victorinini					
<i>Anartia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)				2; 3	
<i>Anartia jatrophae jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)			*	1; 2; 3	
<i>Siproeta epaphus trayja</i> Hübner, [1823]				2; 3	
<i>Siproeta stelenes stelenes</i> (Linnaeus, 1758)				2; 3	
Satyrinae					
Brassolini					
<i>Blepolenis batea</i> ssp. n. (Hübner, [1821])				2; 3	
<i>Brassolis sophorae laurentii</i> Stichel, 1925				2; 3	
<i>Brassolis sophorae sophorae</i> (Linnaeus, 1758)			*	1; 2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
<i>Caligo illioneus illioneus</i> (Cramer, 1775)			*	1; 2; 3	
Brassolini					
<i>Catoblepia berecynthia</i> (Cramer, 1777)			*	1; 2; 3	
<i>Dynastor darius darius</i> (Fabricius, 1775)			*	1; 2; 3	
<i>Eryphanis automedon automedon</i> (Cramer, 1775)			*	1; 2; 3	
<i>Eryphanis reevesii reevesii</i> (Doubleday, [1849])				2; 3	
<i>Narope cyllabarus</i> Westwood, 1851			*	1; 2; 3	
<i>Narope cyllarus</i> Westwood, 1851				2; 3	
<i>Opsiphanes cassiae crameri</i> C. Felder & R. Felder, 1862				2; 3	
<i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, [1808])				1	
<i>Opsiphanes invirae remoliatu</i> Fruhstorfer, 1907			*	2; 3	
Morphini					
<i>Morpho helenor achillides</i> C. Felder & R. Felder, 1867			*	2; 3	
<i>Morpho helenor</i> Cramer, 1776				1	
<i>Morpho menelaus coeruleus</i> (Perry, 1810)			*	2; 3	
<i>Morpho menelaus</i> Linnaeus, 1758				1	
Satyrini					
<i>Amphidecta reynoldsi reynoldsi</i> Sharpe, 1890				2; 3	End. 4
<i>Cercyeuptychia luederwaldti</i> (Spitz, 1931)	<i>Godartiana luederwaldti</i> (Spitz, 1931)			2; 3	End. 4
<i>Cissia eous</i> (Butler, 1867)			*		
<i>Cissia penelope</i> (Fabricius, 1775)				2	
<i>Cissia terrestris</i> (Butler, 1866)			*	2; 3	
<i>Erichthodes narapa</i> (Schaus, 1902)					
<i>Euptychia westwoodi</i> Butler, 1867				3	
<i>Godartiana muscosa</i> (Butler, 1870)				2; 3	
<i>Hermeuptychia aff hermes</i> (Fabricius, 1775)			*	1	
<i>Hermeuptychia fallax</i> (C. Felder & R. Felder, 1862)				2; 3	
<i>Hermeuptychia harmonia</i> (A. Butler, 1867)				2	
<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)				2; 3	
<i>Magneuptychia ocnus</i> (Butler, 1867)				2; 3	
<i>Nhambikuara cerradensis</i> Freitas, Barbosa e Zacca, 2018			*	1	End. 5
<i>Pampasatyris ocelloides</i> (Schaus, 1902)	<i>Stegosatyris ocelloides</i> (Schaus, 1902)			3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
<i>Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe</i> (Fabricius, 1776)			*	1; 2; 3	
Satyrini					
<i>Pareuptychia summandosa</i> (Gosse, 1880)				2; 3	
<i>Paryphthimoides numeria</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	<i>Emeryus numeria</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)			2; 3	
<i>Paryphthimoides phronius</i> (Godart, [1824])	<i>Cissia phronius</i> (Godart, [1824])			2; 3	
<i>Paryphthimoides poltys</i> (Prittwitz, 1865)			*	1; 2; 3	
<i>Paryphthimoides undulata</i> (Butler, 1867)	<i>Hermeuptychia undulata</i> (A. Butler, 1867)			2; 3	
<i>Pharneuptychia innocentia</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)				2; 3	
<i>Pharneuptychia phares</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Praefaunula armilla</i> (Butler, 1867)	<i>Godartiana armilla</i> (A. Butler, 1867)			2; 3	End. 4
<i>Taygetina kerea</i> (A. Butler, 1869)	<i>Taygetis kerea</i> (Butler, 1869)			1; 2; 3	
<i>Taygetis chiquitana</i> Forster, 1964				2; 3	
<i>Taygetis cleopatra</i> C. Felder e R. Felder, 1867			*		
<i>Taygetis echo</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
<i>Taygetis laches</i> Fabricius, 1793				1; 2; 3	
<i>Taygetis mermeria mermeria</i> (Cramer, 1776)				2; 3	
<i>Taygetis virgilia</i> (Cramer, 1776)				2; 3	
<i>Taygetisla cheslaches</i> (Fabricius, 1793)			*		
<i>Taygetomorpha celia</i> (Cramer, 1779)	<i>Pseudodebis celia</i> (Cramer, 1779)			2; 3	
<i>Yphthimoides argyrospila</i> (Butler, 1867)				2; 3	
<i>Yphthimoides celmis</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Yphthimoides maepius maepius</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Yphthimoides ochracea</i> (Butler, 1867)				1; 2; 3	
<i>Yphthimoides pacta</i> (Weymer, 1911)				2; 3	
<i>Yphthimoides patricia</i> (Hayward, 1957)			*	1	
<i>Yphthimoides renata</i> (Stoll, 1780)				1; 2; 3	
<i>Yphthimoides straminea</i> (Butler, 1867)			*	1; 2; 3	End. 4
<i>Yphthimoides yphthima</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)			*	2; 3	
PAPILIONIDAE					
Papilioninae					
Leptocircini					
<i>Protesilaus protesilaus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eurytides protesilaus protesilaus</i> (Linnaeus, 1758)			2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Papilionini					
Papilionini					
<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])			*	2; 3	
<i>Heraclides astyalus astyalus</i> (Godart, 1819)				3	
<i>Papilio anchisiades</i> Esper, 1788	<i>Heraclides anchisiades</i> (Esper, 1788)			1	
<i>Papilio thoas brasiliensis</i> Rothschild & Jordan, 1906	<i>Heraclides thoas brasiliensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)		*	1; 2; 3	
<i>Papilio thoas</i> Linnaeus, 1771	<i>Heraclides thoas</i> (Linnaeus, 1771)			1	
<i>Pterourus scamander grayi</i> (Boisduval, 1836)				3	
Troidini					
<i>Battus crassus crassus</i> (Cramer, 1777)			*	1; 2; 3	
<i>Battus polydamas polydamas</i> (Linnaeus, 1758)			*	1; 2; 3	
<i>Parides anchises</i> (Linnaeus, 1758)			*	1	
<i>Parides anchises foetterlei</i> (Rothschild & Jordan, 1906)				2; 3	
<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)			*		
<i>Parides anchises orbignyana</i> (Lucas, 1852)			*		End. 4
PIERIDAE					
Coliadinae					
<i>Anteos clorinde</i> (Godart, [1824])			*	1; 2; 3	
<i>Anteos menippe</i> (Hübner, [1818])				2; 3	
<i>Aphrissa statira statira</i> (Cramer, 1777)			*	2; 3	
<i>Eurema agave pallida</i> (Chavannes, 1850)				2; 3	
<i>Eurema albula</i> (Cramer, 1775)	<i>Abaeis albula</i> (Cramer, 1775)		*		
<i>Eurema albula albula</i> (Cramer, 1775)	<i>Abaeis albula albula</i> (Cramer, 1775)			2; 3	
<i>Eurema arbela arbela</i> Geyer, 1832	<i>Abaeis arbela arbela</i> (Geyer, 1832)			3	
<i>Eurema deva doris</i> (Röber, 1909)	<i>Teriocolias deva doris</i> (Röber, 1909)			2; 3	
<i>Eurema elathea elathea</i> (Cramer, 1777)			*	2; 3	
<i>Eurema phiale paula</i> (Rober, 1909)			*	2; 3	
<i>Phoebis argante</i> (Fabricius, 1775)			*		
<i>Phoebis argante argante</i> (Fabricius, 1775)			*	2; 3	
<i>Phoebis philea philea</i> (Linnaeus, 1763)				2; 3	
<i>Phoebis sennae sennae</i> (Linnaeus, 1758)			*	2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
<i>Pyrisitia leuce leuce</i> (Boisduval, 1836)				2; 3	
<i>Pyrisitia nise tenella</i> (Boisduval, 1836)			*	2; 3	
Coliadinae					
<i>Rhabdodryas trite banksi</i> (Breyer, 1939)				3	
Dismorphiinae					
<i>Dismorphia amphione astynome</i> (Dalman, 1823)				2; 3	
<i>Dismorphia thermesia thermesia</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Enantia lina psamathe</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Pseudopieris nehemia nehemia</i> (Boisduval, 1836)				2; 3	
Pierinae					
Anthocharidini					
<i>Hesperocharis anguitia anguitia</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Cunizza hirlanda</i> (Stoll, 1790)	<i>Hesperocharis hirlanda</i> (Stoll, 1790)			1	
<i>Cunizza hirlanda planasia</i> Fruhstorfer, 1910	<i>Hesperocharis hirlanda planasia</i> (Fruhstorfer, 1910)	VU	*	2; 3	End. 4
Pierini					
<i>Appias drusilla drusilla</i> (Cramer, 1777)	<i>Glutophrissa drusilla drusilla</i> (Cramer, 1777)			2; 3	
<i>Archonias brassolis tereas</i> (Godart, 1819)			*	2; 3	
<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus, 1764)				1	
<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)				2; 3	
<i>Melete lycimnia paulista</i> Fruhstorfer, 1908			*	2; 3	
RIODINIDAE					
Euselasiinae					
Euselasiini					
<i>Euselasia hygenius occulta</i> Stichel, 1919				1, 3	
<i>Euselasia mys cytis</i> Stichel, 1919				2; 3	End. 4
<i>Euselasia pellonia azurea</i> Callaghan, 1999				2; 3	
<i>Euselasia thucydides truncata</i> Callaghan, 2001				2; 3	
Riodininae					
Emesidini					
<i>Emesis diogenia</i> Prittwitz, 1865			*	2; 3	
<i>Emesis fatimella fatimella</i> Westwood, 1851			*		

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
<i>Emesis mandana</i> (Cramer, 1780)			*	3	
<i>Emesis temesa peruviana</i> (Lathy, 1904)				2; 3	
Eurybiini					
<i>Alesa prema</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Eurybia halimede passercula</i> Stichel, 1915				2; 3	
Helicopini					
<i>Anteros formosus</i> (Cramer, 1777)				2; 3	
<i>Anteros lectabilis</i> Stichel, 1909				2; 3	
<i>Sarota gyas</i> (Cramer, 1775)				2; 3	
Mesosemiini					
<i>Cremna thasus thasus</i> (Stoll, 1780)	<i>Hyphilaria thasus</i> (Stoll, 1780)			3	
<i>Leucochimona icare matatha</i> (Hewitson, 1873)				2; 3	
<i>Mesosemia hesperina</i> Butler, 1874				1	
<i>Mesosemia melpia vaporosa</i> Stichel, 1910				3	End. 4
<i>Mesosemia pardalis</i> Callaghan, 2001				3	End. 4
<i>Napaea eucharila parvipuncta</i> Lathy, 1932	<i>Napaea eucharila</i> (H. Bates, 1867)			2; 3	
Nymphidiini					
<i>Adelotypa zerna</i> (Hewitson, 1872)	<i>Catocyclotis zerna</i> (Hewitson, 1872)			3	
<i>Apodemia paucipuncta</i> Spitz, 1930	<i>Zabuella paucipuncta</i> (Spitz, 1930)			2; 3	
<i>Ariconias glaphyra</i> (Westwood, 1851)				2; 3	
<i>Aricoris caracensis</i> (Callaghan, 2001)			*	3	End. 4
<i>Aricoris constantius</i> (Fabricius, 1793)				2; 3	
<i>Aricoris hubrichi</i> (Stichel, 1926)			*	2; 3	
<i>Aricoris middletoni</i> (Sharpe, 1890)				2; 3	End. 4
<i>Juditha molpe</i> (Hubner, [1808])			*	2; 3	
<i>Lemonias theodora</i> (Godman, 1903)				3	End. 4
<i>Nymphidium leucosia</i> (Hübner, [1806])				3	
<i>Nymphidium lisimon</i> (Stoll, 1790)				2; 3	
<i>Stalachtis phlegia</i> (Cramer, 1779)				1	
<i>Stalachtis phlegia phlegetontia</i> (Perty, 1833)			*	2; 3	
<i>Stalachtis susanna</i> (Fabricius, 1787)	<i>Stalachtis phlegia susanna</i> (Fabricius, 1787)			3	
<i>Synargis agle</i> (Hewitson, [1853])				3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
<i>Synargis axenus</i> (Hewitson, 1876)				2; 3	
<i>Synargis calyce</i> (C. Felder & R. Felder, 1862)				2; 3	
Nymphidiini					
<i>Synargis chaonia</i> (Hewitson, [1853])				3	
<i>Synargis ethelinda</i> (Hewitson, 1870)				2; 3	
<i>Synargis galena</i> (Bates, 1868)				2; 3	
<i>Synargis paulistina</i> (Stichel, 1910)				2; 3	
<i>Theope eudocia</i> Westwood, 1851				2; 3	
<i>Theope foliorum</i> Bates, 1868				2; 3	
<i>Theope thestias</i> Hewitson, 1860				2; 3	
<i>Theope thootes</i> Hewitson, 1860				2; 3	
<i>Thisbe hyalina</i> (Butler, 1867)				3	
Riodinini					
<i>Amarynthys meneria</i> (Cramer, 1776)			*	2; 3	
<i>Ancyluris colubra</i> (Saunders, 1859)				2; 3	
<i>Ancyluris meliboeus meliboeus</i> (Fabricius, 1777)				2; 3	
<i>Baeotis johanna johanna</i> Sharpe, 1890				2; 3	
<i>Calephelis braziliensis</i> McAlpine, 1971				2; 3	
<i>Chalodeta chaonitis</i> (Hewitson, 1866)			*	3	
<i>Chalodeta theodora</i> (C. Felder e R. Felder, 1862)			*	2; 3	
<i>Chorinea licursis</i> (Fabricius, 1775)				2; 3	
<i>Chorinea octavius orchestris</i> Stichel, 1910				3	
<i>Dachetola azora</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Detritivora brasilia</i> (Harvey & Hall, 2002)			*	2; 3	
<i>Detritivora gynaea</i> (Godart, [1824])				2; 3	
<i>Detritivora zama</i> (Bates, 1868)				3	
<i>Lasaia agesilas agesilas</i> (Latreille, [1809])			*	2; 3	
<i>Lyropteryx apollonia sparsa</i> Stichel, 1924				2; 3	
<i>Lyropteryx terpsichore terpsichore</i> Westwood, 1851			*	2; 3	
<i>Melanis aegates lilybaeus</i> (Stichel, 1926)			*	3	
<i>Melanis marathon stenotaenia</i> (Röber, 1904)				3	
<i>Melanis smithiae smithiae</i> (Westwood, 1851)				2; 3	

Tabela 5. Lista de espécies de borboletas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Pinheiro & Emery 2007, 3. Pinheiro & Emery, 2006, 4. Pinheiro *et al.* 2010, 5. Freitas *et al.* 2018. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (End.) = Espécie potencialmente endêmica do bioma Cerrado; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Butterflies of America*.

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Status MMA	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
<i>Parcella amarynthina</i> (C. Felder e R. Felder, 1865)			*	1; 2; 3	
<i>Pheles atricolor atricolor</i> (Butler, 1871)				3	
Riodinini					
<i>Rhetus periander</i> (Cramer, 1777)				1	
<i>Rhetus periander arthuriana</i> (Sharpe, 1890)			*	2; 3	End. 4
<i>Riodina lycisca lycisca</i> (Hewitson, [1853])				2; 3	
<i>Syrmatia nyx</i> (Hübner, [1817])				2; 3	
Symmachiini					
<i>Phaenochitonina fuliginea</i> (Bates, 1868)				2; 3	
<i>Pirascuca sagaris satnius</i> (Dalman, 1823)			*	2; 3	
<i>Stichelia bocchoris</i> (Hewitson, 1876)				2; 3	
<i>Symmachia accusatrix</i> Westwood, 1851				2; 3	
<i>Symmachia hippodice</i> Godman, 1903	<i>Asymma hippodice</i> (Godman, 1903)			2; 3	

1. GBIF: The Global Biodiversity Information Facility (2023) *What is GBIF?* Disponível em: <https://www.gbif.org/what-is-gbif>.
2. Pinheiro, C.E.G. & Emery, E.O. (2007) As borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) da Estação Ecológica do Jardim Botânico, Reserva Ecológica do IBGE e Fazenda Água Limpa (Distrito Federal). *Heringeriana* 1(1): 61-74. <https://doi.org/10.17648/heringeriana.v1i1.119>
3. Pinheiro, C.E.G. & Emery, E.O. (2006) As borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) da Área de Proteção Ambiental do Gama e Cabeça de Veado (Distrito Federal, Brasil). *Biota Neotropica* 6:3.
4. Pinheiro, C.E.G., Malinov, I.K., Emery, E.O. e Schmidt, K. (2010). Endemismos e conservação de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) no bioma Cerrado. In: Diniz I.R., Filho J.M., Machado, R.B. & Cavalcanti R.B (Eds.). *Cerrado: conhecimento científico quantitativo como subsídio para ações de conservação*. Universidade de Brasília, Brasília: pp. 221-236.
5. Freitas, A.V.L., Barbosa, E.P., Zacca, T., Marín, M.A., Beirão, M.V., Silva, A.R.M., Casagrande, M.M., Espeland, M. & Willmott, K.R. (2018) Before it is too late: description of a new genus and species of butterfly from a highly threatened Brazilian biome. *Revista Brasileira de Entomologia* 62 (2): 148-158. <https://doi.org/10.1016/j.rbe.2018.02.003>

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veado, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
BOMBYCIDAE				
Epiinae				
<i>Arotros</i> sp.			1	
CASTNIDAE				
Castniinae				
<i>Telchin licus</i> (Drury, 1773)	<i>Castnia licus</i> (Drury, 1773)		1	
COSMOPTERIGIDAE				
Cosmopteriginae				
<i>Anatrachyntis badia</i> (Hodges, 1962)	<i>Pyroderces badia</i> (Hodges, 1962)		1	
COSSIDAE				
Hypoptinae				
<i>Langsdorfia franckii</i> Hübner, 1824		*		
CRAMBIDAE				
<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll, 1781)			1	
Spilomelinae				
<i>Samea ecclesialis</i> Guenée, 1854			1	
<i>Syngamia florella</i> Cramer, 1781			1	
ELACHISTIDAE				
<i>Antaeotricha</i> sp.			2	
Stenomatinae				
<i>Stenoma cathosiota</i> Meyrick, 1925			2	
EREBIDAE				
Arctiinae				
<i>Argyroeides ophion</i> Walker, 1854			1	
<i>Calodesma</i> sp.		*		
<i>Cosmosoma</i> sp.		*		
<i>Dysschema boisduvalii</i> van der Hoeven & De Vriese, 1840		*		
<i>Dysschema tricolor</i> Sulzer, 1776		*		
Arctiini				
<i>Dinia mena</i> Hübner, 1827			1	
<i>Eucereon compositum</i> Draudt, 1915			1	

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veadado, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Arctiini				
<i>Hypercompe cunigunda</i> Stoll, 1781		*		
<i>Hypercompe</i> sp.		*		
<i>Idalus lineosus</i> Walker, 1869			2	
<i>Idalus</i> sp.		*		
<i>Leucanopsis rosetta</i> Schaus, 1896		*		
<i>Lophocampa seruba</i> Herrich-Schäffer, 1855			1	
<i>Paracles phaeocera</i> Hampson, 1905		*		
<i>Paracles</i> sp.		*		
<i>Parathyris semivitrea</i> Joicey & Talbot, 1916		*		
<i>Pseudalus limonia</i> Schaus, 1896		*		
<i>Symphlebia</i> sp.		*		
<i>Trichura latifascia</i> Walker, 1854			1	
<i>Utetheisa ornatix</i> Linnaeus, 1758		*		
Lithosiini				
<i>Apistosis judas</i> Hübner, 1827		*	1	
<i>Eudesmia ruficollis</i> Donovan, 1798			1	
Calpinae				
<i>Cyclodes caecutiens</i> Hübner, 1806			1	
<i>Feigeria scops</i> (Guénéé, 1852)	<i>Letis scops</i> Guénéé, 1852		1	
<i>Hemeroblemma</i> sp.		*		
<i>Tautobriga glaucopis</i> Hampson, 1926			2	FAL
Erebinae				
<i>Ascalapha odorata</i> Linnaeus, 1758	<i>Phalaena (Bombyx) odorata</i> Linnaeus, 1758		1	
<i>Thysania zenobia</i> Cramer, 1777			1	
Herminiinae				
<i>Physula albipunctilla</i> Schaus, 1916		*		
GEOMETRIDAE				
Ennominae				
<i>Glena</i> sp.			2	FAL
<i>Melanchroia chephise</i> (Stoll, 1782)			1	
<i>Polla celeraria</i> Walker, 1860		*		

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veado, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Ennominae				
<i>Psamatodes abydata</i> (Guenée, 1858)	<i>Macaria abydata</i> Guenée		1	
<i>Stenalcidia</i> sp.			2	
Geometrinae				
<i>Oospila includaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)			1	
<i>Phrudocentra eccentrica</i> Prout, 1916		*		
<i>Synchlora frondaria</i> Guenée, 1857			1	
GRACILLARIIDAE				
<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856			1	
LASIOCAMPIDAE				
Poecilocampinae				
<i>Euglyphis</i> sp.		*		
<i>Titya noctilux</i> Walker, 1855			1	
LIMACODIDAE				
<i>Phobetron hipparchia</i> (Cramer, 1777)			2	
<i>Semyra incisa</i> (Walker, 1855)			2	FAL
MEGALOPYGIDAE				
<i>Edebessa purens</i> Walker, 1855		*		
<i>Megalopyge albicollis</i> (Walker, 1855)		*	1; 2	FAL
<i>Megalopyge braulio</i> Schaus		*		
<i>Norape ovina</i> (Sepp, 1852)		*		
<i>Podalia fuscescens</i> Walker, 1856		*		
<i>Podalia guaya</i> (Schaus, 1927)		*	1	
<i>Podalia orsilochus</i> Cramer, 1775			1	
<i>Podalia</i> sp.		*		
<i>Thoscora xinga</i> (Dognin, 1922)	<i>Trosia xinga</i> (Dognin, 1922)	*		
<i>Trosia anax</i> Dognin, 1923		*		
<i>Trosia dimas</i> (Cramer, 1775)		*		
<i>Trosia dimas</i> (Cramer, 1775)		*		
<i>Trosia donckieri</i> Dognin, 1924		*		
MIMALLONIDAE				

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veado, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Lacosominae				
<i>Druentica</i> sp.		*		
NOCTUIDAE				
Acronictinae				
<i>Argyrosticta decumana</i> Felder, 1874			1	
Noctuinae				
<i>Acroria terens</i> Walker, 1857			1	
<i>Anicla infecta</i> Ochsenheimer, 1816			1	
<i>Elaphria agrotina</i> Guenée, 1852			1	
<i>Micrathetis canifimbria</i> Walker, 1866			1	
<i>Spodoptera eridania</i> Stoll		*		
Plusiinae				
<i>Chrysodeixis includens</i> Walker		*		
NOTODONTIDAE				
<i>Farigia magniplaga</i> Schaus, 1906			2	FAL
<i>Farigia</i> sp.			2	FAL
<i>Hemiceras</i> sp.		*		
OECOPHORIDAE				
Oecophorinae				
<i>Eomichla</i> sp.			2	FAL
<i>Inga encamina</i> (Meyrick, 1912)			2	
PSYCHIDAE				
<i>Oiketicus kirbyi</i> Guilding, 1827			1	
SATURNIIDAE				
Arsenurinae				
<i>Titaea orsinome</i> Hübner, 1824		*		
Ceratocampinae				
<i>Adeloneivaia</i> sp.		*		
<i>Ceratesa hemirhodia</i> Rothschild, 1907		*		
<i>Citheronia laocoon</i> Cramer, 1777			1	
<i>Eacles imperialis cacicus</i> Boisduval, 1868		*		

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veadó, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Ceratocampinae				
<i>Othorene hodeva</i> Druce, 1904		*		
<i>Othorene purpurascens</i> Schaus, 1905		*		
Hemileucinae				
<i>Automeris granulosa</i> Le Conte, 1906			1	
<i>Automeris illustris</i> Walker, 1855		*		
<i>Cathacanta latifasciata</i> Bouvier, 1930		*		
<i>Cathacanta obliqua</i> Bouvier, 1930		*		
<i>Cerodirphia apunctata</i> Dias & Lemaire, 1991		*		
<i>Dirphia avia</i> Cramer, 1780		*		
<i>Dirphia dolosa</i> Bouvier, 1929		*		
<i>Dirphiopsis trisignata</i> C. Felder & R. Felder, 1874		*		
<i>Eubergia altoparanensis</i> Brechlin & Meister, 2011		*		
<i>Eudyaria zeta</i> Berg, 1885		*		
<i>Hylesia ebalus</i> Cramer, 1775		*		
<i>Hylesia metabus</i> Cramer, 1775		*		
<i>Hylesia metapyrrha</i> Walker, 1855		*		
<i>Hyperchiria incisa</i> Walker, 1855		*		
<i>Kentroleuca albilinea</i> Schaus, 1908		*		
<i>Lonomia obliqua</i> Walker, 1855		*		
<i>Periga falcata</i> Walker, 1855		*		
<i>Periphoba arcaei</i> Druce, 1886		*		
<i>Periphoba tangerini</i> Mielke & Furtado, 2006		*		
<i>Pseudautomeris luteata</i> Walker, 1865		*	1	
<i>Pseudodirphia agis</i> Cramer, 1775		*		
Oxyteninae				
<i>Oxytenis modestia</i> Cramer, 1780		*		
Saturniinae				
<i>Copaxa flavina</i> Draudt, 1929		*		
<i>Rothschildia aurota</i> Cramer, 1775		*		
<i>Rothschildia jacobaeae</i> Walker, 1855		*	1	
SPHINGIDAE				

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veado, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Macroglossinae				
Dilophonotini				
<i>Enyo lugubris</i> Linnaeus, 1771			1	
<i>Enyo ocypte</i> Linnaeus, 1758		*		
<i>Erinnyis ello</i> Linnaeus, 1758			1	
<i>Isognathus caricae</i> Linnaeus, 1758		*		
<i>Nyceryx stuarti</i> Rothschild, 1894		*		
<i>Pachylia ficus</i> Linnaeus, 1758			1	
<i>Pachylioides resumens</i> Walker, 1856		*		
<i>Perigonia pallida</i> Rothschild & Jordan, 1903	<i>Perigonia rufescens</i> Daniel, 1949	*		
<i>Perigonia passerina</i> Boisduval		*		
<i>Pseudosphinx tetrio</i> Linnaeus, 1771			1	
<i>Unzela japix discrepans</i> Walker, 1856		*		
Macroglossini				
<i>Xylophanes tersa</i> Linnaeus, 1771		*	1	
Smerinthinae				
Ambulycini				
<i>Protambulyx strigilis</i> Linnaeus, 1771		*	1	
Sphinginae				
Acherontini				
<i>Agrius cingulata</i> Fabricius, 1775		*		
Sphingini				
<i>Cocytius antaeus</i> Drury, 1773			1	
<i>Cocytius duponchel</i> Poey, 1832			1	
<i>Manduca rustica</i> Fabricius, 1775		*		
TINEIDAE				
<i>Phereoeca uterella</i> (Walsingham, 1897)			1	
TORTRICIDAE				
Olethreutinae				
<i>Episimus</i> sp.			2	
Tortricinae				

Tabela 6. Lista de espécies de mariposas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. **Legenda Fonte Dados Secundários e Observações:** 1. GBIF, 2. Oliveira 2010. **Legenda Fonte Dados Primários:** Coleção Entomológica do JBB (*). **Legendas gerais:** (FAL) = Borboletas coletadas na FAL (UnB), que faz parte da APA Gama e Cabeça-de-Veado, mas não necessariamente coletadas na EEJBB; (*) = Sinônimos obtidos através do site *Catalogue of Life* (COL).

Família / Subfamília / Tribo / Espécie	Sinônimos *	Fonte Dados Primários JBB	Fonte Dados Secundários	Observações
Tortricinae				
<i>Platynota rostrana</i> (Walker, 1863)			2	

1. GBIF: The Global Biodiversity Information Facility (2023) *What is GBIF?* Disponível em: <https://www.gbif.org/what-is-gbif>.
2. Oliveira, L.B. (2010) *Diversidade e fenologia de lagartas folívoras em Roupala montana (Proteaceae) no Cerrado do Brasil Central*. Dissertação de mestrado, UnB.

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
ARACHNIDA		
Araneae		
Araneidae		
<i>Araneus guttatus</i> (Keyserling, 1865)	1	
<i>Argiope argentata</i> (Fabricius, 1775)	1	
<i>Cyrtophora citricola</i> (Forskål, 1775)	1	
<i>Eriophora edax</i> (Blackwall, 1863)	1	
<i>Gasteracantha cancriformis</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>Manogeta porracea</i> (C.L.Koch, 1838)	1	
<i>Micrathena plana</i> (C.L.Koch, 1836)	1	
<i>Parawixia bistrinata</i> (Rengger, 1836)	1	
<i>Trichonephila clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	1	
<i>Trichonephila sexpunctata</i> (Giebel, 1867)	1	
<i>Verrucosa cylicophora</i> (Badcock, 1932)	1	
Caponiidae		
<i>Nops minas</i> Sánchez-Ruiz & Brescovit, 2018	1	
Cheiracanthiidae		
<i>Cheiracanthium inclusum</i> (Hentz, 1847)	1	
Corinnidae		
<i>Creugas gulosus</i> Thorell, 1878	1	
<i>Falconina gracilis</i> (Keyserling, 1891)	1	
Ctenidae		
<i>Ctenus ornatus</i> (Keyserling, 1877)	1	
<i>Phoneutria eickstedtae</i> Martins & Bertani, 2007	1	
Gnaphosidae		
<i>Camillina relucens</i> (Simon, 1893)	1	
<i>Eilica pomposa</i> Medan, 2001	1	
<i>Latonigena lami</i> Ott, Rodrigues & Brescovit, 2012	1	
Idiopidae		
<i>Idiops pirassununguensis</i> Fukami & Lucas, 2005	1	
Linyphiidae		

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Linyphiidae		
<i>Eurymorion triunfo</i> Rodrigues & Ott, 2010	1	
<i>Spherozonia rubescens</i> O.Pickard-Cambridge, 1871	1	
Lycosidae		
<i>Aglaoctenus lagotis</i> (Holmberg, 1876)	1	
<i>Alopecosa moesta</i> (Holmberg, 1876)	1	
Mimetidae		
<i>Mimetus hieroglyphicus</i> Mello-Leitão, 1929	1	
Miturgidae		
<i>Teminius insularis</i> (Lucas, 1857)	1	
Oecobiidae		
<i>Oecobius navus</i> Blackwall, 1859	1	
Oxyopidae		
<i>Oxyopes salticus</i> Hentz, 1845	1	
Pholcidae		
<i>Physocyclus globosus</i> (Taczanowski, 1874)	1	
<i>Smeringopus pallidus</i> (Blackwall, 1858)	1	
Salticidae		
<i>Cylistella cuprea</i> (Simon, 1864)	1	
<i>Freya nigrotaeniata</i> (Mello-Leitão, 1945)	1	
<i>Gypogyna forceps</i> Simon, 1900	1	
<i>Hasarius adansoni</i> (Audouin, 1826)	1	
<i>Marma nigritarsis</i> (Simon, 1900)	1	
<i>Menemerus bivittatus</i> (Dufour, 1831)	1	
<i>Philira micans</i> (Simon, 1902)	1	
<i>Semiopyla cataphracta</i> Simon, 1901	1	
<i>Titanattus notabilis</i> (Mello-Leitão, 1943)	1	
<i>Tullgrenella yungae</i> Galiano, 1970	1	
Scytodidae		
<i>Scytodes fusca</i> Walckenaer, 1837	1	
<i>Scytodes nambiussu</i> Rheims & Brescovit, 2006	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Scytodidae		
<i>Scytodes ytu</i> Rheims & Brescovit, 2009	1	
Sparassidae		
<i>Quemedice enigmaticus</i> Mello-Leitão, 1942	1	
Theraphosidae		
<i>Acanthoscurria paulensis</i> Mello-Leitão, 1923	1	
<i>Sickius longibulbi</i> Soares & Camargo, 1948	1	
Theridiidae		
<i>Latrodectus geometricus</i> C.L.Koch, 1841	1	
<i>Nesticodes rufipes</i> (Lucas, 1846)	1	
<i>Nihonhimea tessellata</i> (Keyserling, 1884)	1	
<i>Rhomphaea procera</i> (O.Pickard-Cambridge, 1898)	1	
<i>Steatoda ancorata</i> (Holmberg, 1876)	1	
<i>Steatoda diamantina</i> Levi, 1962	1	
Trochanteriidae		
<i>Vectius niger</i> (Simon, 1880)	1	
Opiliones		
Gonyleptidae		
<i>Mischonyx cuspidatus</i> (Roewer, 1913)	1	
Scorpiones		
Bothriuridae		
<i>Bothriurus araguayae</i> Vellard, 1934	1	
Buthidae		
<i>Tityus fasciolatus</i> Pessôa, 1935	1	
GASTROPODA		
Stylommatophora		
Achatinidae		
<i>Leptinaria unilamellata</i> (d'Orbigny, 1838)	1	
<i>Lissachatina fulica</i> (Bowdich, 1822)	1	
<i>Subulina octona</i> (Brugüière, 1789)	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Bulimulidae		
<i>Drymaeus gereti</i> Ancey, 1901	1	
Camaenidae		
<i>Bradybaena similis</i> (Férussac, 1822)	1	
Strophocheilidae		
<i>Megalobulimus abbreviatus</i> (Bequaert, 1948)	1	
Systemmatophora		
Veronicellidae		
<i>Belocaulus angustipes</i> (Heynemann, 1885)	1	
<i>Sarasinula linguaeformis</i> (C.Semper, 1885)	1	
INSECTA		
Blattodea		
Blaberidae		
<i>Pycnoscelus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	1	
Termitidae		
<i>Constrictotermes cyphergaster</i> (Silvestri, 1901)	1	
<i>Rhynchotermes nasutissimus</i> (Silvestri, 1901)	1	
<i>Silvestritermes euamignathus</i> (Silvestri, 1901)	1	
Coleoptera		
Buprestidae		
<i>Euchroma giganteum</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>Psiloptera argyrophora</i> (Perty, 1830)	1	
Cerambycidae		
<i>Dorcacerus barbatus</i> (Olivier, 1790)	1	
<i>Hamaticherus bellator</i> Audinet-Serville, 1834	1	
<i>Oxymerus aculeatus</i> Dupont, 1838	1	
<i>Oxymerus basalis</i> (Dalman, 1823)	1	
<i>Retrachydes thoracicus</i> (Olivier, 1790)	1	
<i>Trachyderes succinctus</i> (Linnaeus, 1758)	1	
Cetoniidae		

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Cetoniidae		
<i>Allorhina cincta</i> (Gory & Percheron, 1833)	2	FAL
<i>Allorhina menetriesi</i> (Mannerheim, 1828)	1; 2	FAL
<i>Euphoria lurida</i> (Fabricius, 1775)	2	FAL
<i>Gymnetis flavomarginata</i> Blanchard, 1837	2	FAL
<i>Gymnetis hebraica</i> (Drapiez, 1820)	2	FAL
<i>Gymnetis rubrocincta</i> (Schürhoff, 1937)	2	FAL
<i>Gymnetis rufilatrix</i> (Illiger, 1800)	1; 2	FAL
<i>Gymnetis</i> sp.	2	FAL
<i>Hologymnetis undulata</i> (Vigors, 1824)	2	FAL
<i>Hoplopyga albiventris</i> (Gory & Percheron, 1833)	2	FAL
<i>Hoplopyga brasiliensis</i> (Gory & Percheron, 1833)	2	FAL
<i>Hoplopyga liturata</i> (Olivier, 1789)	2	FAL
<i>Hoplopygothrix atropurpurea</i> (Schaum, 1841)	2	FAL
<i>Inca bonplandi</i> (Gyllenhal, 1817)	2	FAL
<i>Marmarina maculosa</i> (Olivier, 1789)	2	FAL
Chelonariidae		
<i>Chelonarium</i> sp.	1	
Chrysomelidae		
<i>Chlamisus</i> sp.	1	
<i>Coralimela aeneoplagiata</i> (Lucas, 1857)	1	
<i>Coralimela brunnea</i> (Thunberg, 1821)	1	
<i>Diabrotica speciosa</i> Germar, 1824	1	
<i>Sceloenopla bidens</i> (Fabricius, 1792)	1	
<i>Stolas conspersa</i> (Germar, 1824)	1	
<i>Typophorus nigrinus</i> (Fabricius, 1801)	1	
Coccinellidae		
<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Mulsant, 1853	1	
<i>Cycloneda sanguinea</i> (Linnaeus, 1763)	1	
<i>Diomus</i> sp.	1	
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Coccinellidae		
<i>Psyllobora</i> sp.	1	
<i>Zagreus bimaculosus</i> (Mulsant, 1850)	1	
Curculionidae		
<i>Cydianerus latruncularius</i> (Perty, 1832)	1	
<i>Homalinotus coriaceus</i> L.Gyllenhal, 1836	1	
<i>Naupactus bellus</i> Boheman, 1833	1	
<i>Teratopactus vittatus</i> (Mannerheim, 1833)	1	
Dryophthoridae		
<i>Dynamis borassi</i> (J.C.Fabricius, 1802)	1	
Dynastidae		
<i>Aegopsis bolboceridus</i> (Thomson, 1860)	1	
<i>Coelosis bicornis</i> (Leske, 1779)	1	
Meloidae		
<i>Epicauta</i> sp.	1	
Melyridae		
<i>Astylus</i> sp.	1	
Rutelidae		
<i>Macraspis festiva</i> Burmeister, 1844	1	
<i>Pelidnota sumptuosa</i> (Vigors, 1825)	1	
Scarabaeidae		
<i>C. (Coproghanaeus s. str.) dardanus</i> (MacLeay, 1819)	3	FAL
<i>Coproghanaeus cyanescens</i> (d'Olsoufieff, 1924)	3	FAL
<i>Coproghanaeus dardanus</i> (MacLeay, 1819)	3	FAL
<i>Coproghanaeus ensifer</i> (Germar, 1824)	1; 3	IBGE / FAL
<i>Coproghanaeus horus</i> (Waterhouse, 1891)	3	IBGE
<i>Coproghanaeus spitzii</i> (Pessôa, 1934)	3	IBGE / FAL
<i>Dendropaemon nitidicollis</i> Olsoufieff, 1924	1	
<i>Dichotomius smaragdinus</i> (Perty, 1830)	1	
<i>Oxysternon palaemon</i> Castelnau, 1840	1	
Staphylinidae		

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Staphylinidae		
<i>Eulissus chalybaeus</i> Mannerheim, 1830	1	
Diptera		
Agromyzidae		
<i>Calycomyza malvae</i> (Burgess, 1880)	1	
Asilidae		
<i>Aphestia annulipes</i> (Macquart, 1838)	1	
<i>Rhopalogaster araujoi</i> Carrera, 1952	1	
Calliphoridae		
<i>Chloroprocta idioidea</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	1	
<i>Chrysomya megacephala</i> (Fabricius, 1794)	1	
<i>Lucilia eximia</i> (Wiedemann, 1919)	4	
Culicidae		
<i>Aedes aegypti</i> (Linnaeus, 1762)	1	Exótica
Drosophilidae		
<i>Amiota</i> sp.1	5	
<i>Drosophila ananassae</i> Doleschall, 1858	5	Exótica
<i>Drosophila arauna</i> Pavan & Nacur, 1950	5	
<i>Drosophila atrata</i> Burla & Pavan, 195	5	
<i>Drosophila bocainensis</i> Pavan & Cunha, 1947	5	
<i>Drosophila bromelioides</i> Pavan & Cunha, 1947	5	
<i>Drosophila caponei</i> Pavan & Cunha, 1947	5	
<i>Drosophila capricorni</i> Dobzhansky & Pavan, 1943	5	
<i>Drosophila cardini</i> Sturtevant, 1916	5	
<i>Drosophila fascioloides</i> Dobzhansky & Pavan, 1943	5	
<i>Drosophila fumipennis</i> Duda, 1925	5	
<i>Drosophila griseolineata</i> Duda, 1927	5	
<i>Drosophila guaru</i> Dobzhansky & Pavan, 1943	5	
<i>Drosophila immigrans</i> Sturtevant, 1921	5	
<i>Drosophila malerkotliana</i> Parshad & Paika, 1964	5	Exótica
<i>Drosophila mediopicta</i> Frota-Pessoa, 1954	5	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Drosophilidae		
<i>Drosophila mediopunctata</i> Dobzhansky & Pavan, 1943	5	
<i>Drosophila mediotriata</i> Duda, 1925	5	
<i>Drosophila mercatorum</i> Patterson & Wheeler, 1942	5	
<i>Drosophila nebulosa</i> Sturtevant, 1916	5	
<i>Drosophila neoelliptica</i> Pavan e Magalhães	5	
<i>Drosophila ornatifrons</i> Duda, 1927	5	
<i>Drosophila paulistorum</i> Dobzhansky & Pavan, 1949	5	
<i>Drosophila polymorpha</i> Dobzhansky & Pavan, 1943	5	
<i>Drosophila pseudosaltans</i> Magalhães, 1956	5	
<i>Drosophila saltans</i> Sturtevant, 1916	5	
<i>Drosophila schildi</i> Malloch, 1924	5	
<i>Drosophila simulans</i>	5	Exótica
<i>Drosophila</i> sp.1	5	
<i>Drosophila</i> sp.2	5	
<i>Drosophila</i> sp.3	5	
<i>Drosophila</i> sp.4	5	
<i>Drosophila</i> sp.5	5	
<i>Drosophila sturtevanti</i> Duda, 1927	5	
<i>Drosophila willistoni</i> Sturtevant, 1916	5	
<i>Scaptodrosophila latifasciaeformis</i>	5	Exótica
<i>Zaprionus indianus</i> Gupta, 1970	1; 5	Exótica
Psychodidae		
<i>Clogmia albipunctata</i> Williston	1	
Sarcophagidae		
<i>Dexosarcophaga</i> sp.	4	
<i>Oxysarcodexia</i> sp.	4	
<i>Peckia (Pattonella) intermutans</i> (Walker, 1861)	4	
<i>Peckia (Squamatodes) trivittata</i> (Curran, 1927)	4	
<i>Sarcodexia lambens</i> (Wiedemann, 1830)	4	
Stratiomyidae		

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Stratiomyidae		
<i>Hermetia illucens</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>Ptecticus testaceus</i> (Fabricius, 1794)	1	
Syrphidae		
<i>Dioprosopa clavata</i> (Fabricius, 1794)	1	
<i>Ocyptamus dimidiatus</i> (Fabricius, 1781)	1	
<i>Toxomerus politus</i> Macquart, 1842	1	
<i>Toxomerus virgulatus</i> (Macquart, 1846)	1	
Tabanidae		
<i>Anthomyia illocata</i> Walker, 1856	1	
Tachinidae		
<i>Xanthozona melanopyga</i> (Wiedemann, 1830)	1	
Hemiptera		
Cercopidae		
<i>Deois flavopicta</i> (Stål, 1854)	1	
Cicadellidae		
<i>Protalembrella brasiliensis</i> (Baker, 1899)	1	
<i>Sordana sordida</i> (Stål, 1854)	1	
Cicadidae		
<i>Carineta diardi</i> (Guérin-Méneville, 1829)	1	
<i>Quesada gigas</i> (Olivier, 1790)	1	
Coreidae		
<i>Acanthocephala mercur</i> (Mayr, 1865)	1	
<i>Anisoscelis marginellus</i> (Dallas, 1852)	1	
<i>Crinocerus sanctus</i> (Fabricius, 1775)	1	
<i>Hypselonotus interruptus</i> Hahn, 1833	1	
<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas, 1852)	1	
<i>Lucullia flavovittata</i> Stål, 1865	1	
<i>Machtima crucigera</i> (Fabricius, 1775)	1	
<i>Pachylis pharaonis</i> (Herbst, 1784)	1	
<i>Spartocera fusca</i> (Thunberg, 1783)	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Coreidae		
<i>Sphictyrtus chrysis</i> (Lichtenstein, 1796)	1	
Fulgoridae		
<i>Lystrenia dyrceae</i> Fennah & Carvalho, 1963	1	
Lygaeidae		
<i>Oncopeltus unifasciatellus</i> Slater, 1964	1	
Membracidae		
<i>Enchenopa albidorsa</i> (Fairmaire, 1846)	1	
<i>Enchenopa gracilis</i> (Germar, 1821)	1	
<i>Membracis foliatafasciata</i> (De Geer, 1773)	1	
<i>Umbonia spinosa</i> (Fabricius, 1775)	1	
Miridae		
<i>Taedia signata</i> Carvalho & Gomes, 1971	1	
Pentatomidae		
<i>Agroecus griseus</i> Dallas, 1851	1	
<i>Chinavia rideri</i> (Frey-da-Silva & Grazia, 2001)	1	
<i>Edessa rufomarginata</i> (De Geer, 1773)	1	
<i>Loxa viridis</i> (Palisot, 1811)	1	
<i>Podisus nigrispinus</i> (Dallas, 1851)	1	
Reduviidae		
<i>Apiomerus lanipes</i> (Fabricius, 1803)	1	
<i>Brontostoma discus</i> (Burmeister, 1835)	1	
<i>Montina confusa</i> (Stål, 1859)	1	
<i>Salyavata nigrofasciata</i> Lima, 1935	1	
<i>Zelurus albispinus</i> (Erichson, 1848)	1	
<i>Zelus</i> sp.	1	
Hymenoptera		
Andrenidae		
<i>Oxaea flavescens</i> Klug, 1807	1	
Apidae		
<i>Acanthopus excellens</i> Schrottky, 1902	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Apidae		
<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	1	
<i>Centris collaris</i> Lepeletier, 1841	1	
<i>Ctenioschelus goryi</i> (Romand, 1840)	1	
<i>Eulaema nigrita</i> Lepeletier, 1841	1	
<i>Hoplihora superba</i> (Ducke, 1902)	1	
<i>Oxytrigona tataira</i> (Smith, 1863)	1	
<i>Paratrigona lineata</i> (Lepeletier, 1836)	1	
<i>Partamona combinata</i> Pedro & Camargo, 2003	1	
<i>Tetragona clavipes</i> (Fabricius, 1804)	1	
<i>Tetragonisca angustula</i> (Latreille, 1811)	1	
<i>Trigona hyalinata</i> (Lepeletier, 1836)	1	
<i>Trigona spinipes</i> (Fabricius, 1793)	1	
<i>Xylocopa fimbriata</i> Fabricius, 1804	1	
<i>Xylocopa griseescens</i> Lepeletier, 1841	1	
Braconidae		
<i>Braconidae</i> sp.	4	
Eumenidae		
<i>Polistes satan</i> Bequard, 1940	1	
<i>Polistes versicolor</i> (Olivier, 1791)	1	
<i>Polybia chrysothorax</i> (Lichtenstein)	1	
<i>Polybia jurinei</i> de Saussure, 1854	1	
<i>Polybia occidentalis</i> (Olivier, 1791)	1	
<i>Polybia paulista</i> Ihering, 1896	1	
<i>Polybia sericea</i> (Olivier, 1792)	1	
<i>Zeta argillaceum</i> (Linnaeus, 1758)	1	
Formicidae		
<i>Acromyrmex ambiguus</i> (Emery, 1888)	1	
<i>Atta laevigata</i> (Smith, 1858)	1	
<i>Atta sexdens</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>Camponotus melanoticus</i> Emery, 1894	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Formicidae		
<i>Camponotus rufipes</i> (Fabricius, 1775)	1	
<i>Camponotus sericeiventris</i> (Guérin-Méneville, 1838)	1	
<i>Cephalotes clypeatus</i> (Fabricius, 1804)	1	
<i>Cephalotes pusillus</i> (Klug, 1824)	1	
<i>Labidus praedator</i> (Smith, 1858)	1	
<i>Nomamyrmex esenbeckii</i> (Westwood, 1842)	1	
<i>Pheidole oxyops</i> Forel, 1908	1	
Mutillidae		
<i>Hoplocrates</i> sp.	1	
<i>Hoplomutilla myops</i> (Burmeister, 1854)	1	
Pergidae		
<i>Perreyia flavipes</i> Konow, 1899	1	
Scoliidae		
<i>Dielis dorsata</i> (Fabricius, 1787)	1	
Vespidae		
<i>Agelaia pallipes</i> (Olivier, 1791)	1	
<i>Apoica pallens</i> (Fabricius, 1804)	1	
<i>Brachygastra lecheguana</i> (Latreille, 1824)	1	
<i>Chartergellus communis</i> Richards, 1978	1	
<i>Mischocyttarus cerberus</i> Ducke, 1918	1	
<i>Protopolybia exigua</i> (de Saussure, 1906)	1	
<i>Synoeca surinama</i> (Linnaeus, 1767)	1	
Mantodea		
Mantidae		
<i>Oxyopsis</i> sp.	1	
Photinaidae		
<i>Photina</i> sp.	1	
Neuroptera		
Hemerobiidae		
<i>Notiobiella cixiiformis</i> (Gerstaecker, 1888)	1	

Tabela 7. Lista de espécies de invertebrados (exceto Lepidoptera) da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.

Legenda Fonte Dados Secundários e Observações: 1. GBIF, 2. Evangelista Neto *et al.* 2017, 3. Bernardes 2015, 4. Ledo *et al.* 2012, 5. Roque, 2013. **Legendas gerais:** (FAL) = Invertebrados coletados na FAL (UnB); (IBGE / FAL) = Coletados na RECOR IBGE e na FAL; (IBGE) = Coletados na RECOR IBGE; (Exótica) = Espécie exótica/invasora, ou seja, não nativa do bioma Cerrado.

Classe / Ordem / Família	Fonte Dados Secundários	Observações
Neuroptera		
<i>Nusalala tessellata</i> (Gerstaecker, 1888)	1	
Odonata		
Libellulidae		
<i>Erythemis vesiculosa</i> Fabricius, 1775	1	
<i>Erythrodiplax fusca</i> Rambur, 1842	1	
<i>Erythrodiplax umbrata</i> Linnaeus, 1758	1	
<i>Orthemis discolor</i> Burmeister, 1839	1	
Orthoptera		
Acrididae		
<i>Abracris flavolineata</i> (De Geer, 1773)	1	
<i>Schistocerca flavofasciata</i> (De Geer, 1773)	1	
Romaleidae		
<i>Chromacris nuptialis</i> (Gerstaecker, 1873)	1	
<i>Chromacris speciosa</i> (Thunberg, 1824)	1	
<i>Tropidacris collaris</i> (Stoll, 1813)	1	
<i>Xestotrachelus robustus</i> (Bruner, 1911)	1	
<i>Zoniopoda exilipes</i> Bruner, 1906	1	
<i>Zoniopoda similis</i> Bruner, 1906	1	
Tettigoniidae		
<i>Pycnopalpa bicordata</i> (Saint-Fargeau & Serville, 1825)	1	
MALACOSTRACA		
Isopoda		
Armadillidiidae		
<i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804)	1	

1. GBIF: The Global Biodiversity Information Facility (2023) *What is GBIF?* Disponível em: <https://www.gbif.org/what-is-gbif>.
2. Evangelista Neto, J., Oliveira, C.M., Vaz-de-Mello, F.Z. & Frizzas, M.R. (2017) Diversity of Cetoniidae (Insecta: Coleoptera) in the Cerrado of Central Brazil. *Entomological Science* 21: 84-92. <https://doi.org/10.1111/ens.12284>
3. Bernardes, T.A. (2015) *Contribuição ao conhecimento do gênero Coprophanaeus (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) no Cerrado do Distrito Federal*. Dissertação de mestrado. Pós-Graduação em Zoologia. Universidade de Brasília. 67p.
4. Ledo, R.M.D., Barros, R.M. & Pujol-Luz, J.R. (2012) Sarcophagidae and Calliphoridae related to *Rhinella schneideri* (Anura, Bufonidae), *Bothrops moojeni* (Reptilia, Serpentes) and *Mabuya frenata* (Reptilia, Lacertilia) carcasses in Brasília, Brazil. *Revista Brasileira de Entomologia* 56(3): 377–380.
5. Roque, F. (2013) *Dinâmica metapopulacional e diversidade beta de drosofilídeos (Insecta, Diptera) associados a matas de galeria no Cerrado do Distrito Federal*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal. Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. 103p.

Tabela 8. Lista de espécies de vertebrados ameaçados de extinção da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e seus últimos registros de dados primários (JBB) ou secundários. **Legenda:** (1) = Dados obtidos através da Portaria MMA Nº 148, de 7 de junho de 2022 - atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção; (*) = Data da publicação do trabalho utilizado como dado secundário, e não necessariamente do último registro da espécie.

Classe / Ordem / Família	Nome científico	Nome popular	Status IUCN	Status MMA (1)	Ano do último registro na EEJBB/APA
ACTINOPTERYGII					
Cyprinodontiformes					
Rivulidae	<i>Simpsonichthys boitonei</i> Carvalho, 1959	Pirá-brasília	VU	CR	2018
AMPHIBIA					
Anura					
Hylidae	<i>Boana buriti</i> (Caramaschi & Cruz, 1999)		DD	VU	2011*
AVES					
Accipitriformes					
Accipitridae	<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	Águia-cinzenta	EN	EN	2019
Gruiformes					
Rallidae	<i>Laterallus xenopterus</i> Conover, 1934	Sanã-de-cara-ruiva	VU	EN	2001*
Passeriformes					
Emberizidae	<i>Coryphaspiza melanotis</i> (Temminck, 1822)	Tico-tico-de-máscara-negra	VU	VU	2001*
Rhinocryptidae	<i>Scytalopus novacapitalis</i> Sick, 1958	Tapaculo-de-brasília	EN	EN	2001*
Scleruridae	<i>Geositta poeciloptera</i> (Wied-Neuwied, 1830)	Andarilho	VU	VU	2001*
Thraupidae	<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)		EN	VU	2011
Tyrannidae	<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	Galito	VU	VU	2011*
	<i>Knipolegus franciscanus</i> E. Snethlage, 1928	Maria-preta-do-nordeste	LC	VU	2004
Tinamiformes					
Tinamidae	<i>Nothura minor</i> (von Spix, 1825)	Codorna-mineira	VU	EN	1984*
	<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)	Inhambu-carapé	EN	EN	2011*
MAMMALIA					
Artiodactyla					
Cervidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (Linnaeus, 1758)	Veado-campeiro	NT	VU	2020
Carnivora					
Canidae	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	Lobo-guará, guará	NT	VU	2023
	<i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	Raposa-do-campo	NT	VU	2020*
	<i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)	Cachorro-do-mato-vinagre	NT	VU	2011*
Felidae	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (E. Geoffroy & Saint-Hilaire, 1803)	Jaguarundi, gato-mourisco	LC	VU	2020
	<i>Leopardus colocolo</i> (Molina, 1782)	Gato-palheiro	NT	VU	2011*
Chiroptera					

Tabela 8. Lista de espécies de vertebrados ameaçados de extinção da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e seus últimos registros de dados primários (JBB) ou secundários. **Legenda:** (1) = Dados obtidos através da Portaria MMA Nº 148, de 7 de junho de 2022 - atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção; (*) = Data da publicação do trabalho utilizado como dado secundário, e não necessariamente do último registro da espécie.

Classe / Ordem / Família	Nome científico	Nome popular	Status IUCN	Status MMA (1)	Ano do último registro na EEJBB/APA
Chiroptera					
Furipteridae	<i>Furipterus horrens</i> (F. Cuvier, 1828)	Morcego	LC	VU	2011*
Phyllostomidae	<i>Lonchophylla dekeyseri</i> (Taddei, Vizotto & Sazima 1983)	Morcego	EN	EN	2011*
Cingulata					
Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792)	Tatu-canastra	VU	VU	2023
Perissodactyla					
Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Anta	VU	VU	2018
Pilosa					
Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamanduá-bandeira	VU	VU	2023
Rodentia					
Cricetidae	<i>Thalpomys cerradensis</i> (Hershkovitz, 1990)	Rato-do-chão	LC	VU	2020*
	<i>Thalpomys lasiotis</i> (Thomas, 1916)	Rato-do-chão	LC	EN	2020*